

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ANTICOX soluție orală, preparat anticoccidial

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Mobedco-Vet

The Arab Pesticides And Veterinary Drugs Mfg. Co.

Telefax: 5354191/192/161/949

Iordania

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Compoziția la 1 ml de preparat:

Substanța activă:

Diclazuril 10 mg

Excipienti:

N- metilpirolidona 220 mg

Trietanolamina 452 mg

Polietilen glicol 400 pînă la 1 ml

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Este indicat pentru tratarea coccidiozei la pui cauzată de Eimeria acervulina, E. brunetti, E.maxima, E.mitis, E.necatrix și E. Tenella.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra gainilor ouatoare care produc oua pentru consumul uman.

5. REACȚII ADVERSE

Nu au fost raportate

6. SPECII ȚINTĂ

Păsări



7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Doze și mod de administrare:

Profilaxie la pui: 50 ml / 200 litri de apă de băut în decurs de 48 de ore.

Tratament la pui: 100 ml / 200 litri de apă de băut în decurs de 48 de ore.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Pentru ouă: a nu se administra găinilor ouătoare care produc ouă pentru consumul

Pentru carne: Carnea nu va fi consumată în alimentația umană pe parcursul tratamentului și 5 zile după ultima administrare.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat, ferit de lumini, la temperaturi până la 25 °C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deseuri rezultate din utilizarea acestui produs medicinal veterinar trebuie eliminat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (interdicții)

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu este cazul

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Spălați mâinile după administrare

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu este cazul

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se administra concomitent cu alți coccidiostatici.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Termen de valabilitate în ambalaj intact: 3 ani

Termen de valabilitate după deschiderea ambalajului : 28 zile

Termen de valabilitate după reconstituire: 24 ore

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Recipient de polietilenă de 500 ml și 1 litru cu capac de polietilenă, tapetate cu filet de etanșare cu inducție din folie de aluminiu.

Nu toate dimensiunile ambalajelor pot fi comercializate.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

02/2019

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

