



3. INDICATII TERAPEUTICE

-Pui: *E.acervulina*, *E.brunetti*, *E.maxima*, *E.mitis*, *E.necatrix*, *E.tenella*

-Curcani: E.adenoides, E.meleagrimitis

Toltavet acționează asupra tuturor stadiilor de dezvoltare intracelulară a Coccidelor.

4. CONTRAINDICATII

A nu se administra păsărilor ouătoare.

A nu se administra păsărilor cu hipersensibilitate la substanță activă sau oricare din componenții medicamentului.

5. REACTII ADVERSE

Nu se cunosc.

6. SPECII TINTĂ

Păsări și curcani

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Pentru administrare pe cale orală.

7 mg de Toltrazuril/ 1 kg de masă corporală/ pe zi în decurs de 2 zile.

Această doză corespunde la 28 ml de Toltavet la 100 kg de greutate corporală/ pe zi în decurs de 2 zile.

Această doză corespunde în mediu la 25ppm de Toltrazuril în apă de băut pentru medicație continuă timp de 48 de ore sau la 75 ppm Toltrazuril în apă de băut administrată 8 ore/ pe zi în decurs de 2 zile. (Această doză poate fi ajustată la volumul de apă consumat de păsări.)

Regim de tratament:

Un tratament unic este complet eficient. În cazul unor infecții grave tratamentul poate fi repetat peste 5 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

- Păsări: Carnea de pasăre nu se va consuma în alimentație în perioada tratamentului și 21 de zile după ultima administrare.

- Nu se va administra păsărilor cu 14 zile înainte de ouat sau păsărilor care produc ouă pentru consumul uman.

9. PRECAUTII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperaturi ce nu depășesc 30°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeuri provenite de la astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.



11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Măsurile de igienă ajută la reducerea riscului de coccidioză. Prin urmare, se recomandă în procesul tratamentului să se atragă o atenție deosebită la igiena și curățenia încăperii, precum și la reducerea umidității.

Se recomandă tratarea tuturor animalelor într-un padoc. Pentru rezultate reușite, tratamentul trebuie inițiat înainte ca semnele clinice ale bolii să se răspândească în întregul grup.

Precauții speciale pentru administrare la animale:

În cazul oricărui agent antiparazitar, utilizarea frecventă și repetată a agenților antiprotozoici din aceeași clasă de substanțe active și subdozarea datorată subestimării greutateii corporale poate duce la dezvoltarea rezistenței. Este important să respectați doza recomandată pentru a minimiza riscul de rezistență.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu medicamentul, îmbracăți mănuși din cauciuc.

Nu ingerați. În caz de ingestie accidentală, consultați de urgență medicul și arătați prospectul sau eticheta medicamentului.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu medicamentul.

Medicamentul de uz veterinar este o soluție alcalină.

În caz de contact direct cu ochii sau pielea, spălați abundent cu apă.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul administrării medicamentului.

Spălați-vă mâinile după utilizare.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Toltavet este compatibil cu antibioticele, cum ar fi Enroflaxacina, Ampicilina, Cloramfenicol, Furazolidon, Neomicina, Tetraciclina, Tiamulina, Tilozina, Kitasamycin, acceleratorii creșterii, cum ar fi Avoparcin, Flavomicin, Virginiamicin, Zn-Bacitracin, coccidiostaticele cu ionofor, coccidiostaticele chimice ca DOT, Coyden, Lerbek, Arprinocid și antiprotozoare, cum ar fi Dimetridazol, Ipronidazol și Ronidazol.

Supradozare:

O supradozare echivalentă cu 3 – 5 doze normale este tolerată fără simptome.

Informații suplimentare:

Toltavet nu influențează dezvoltarea imunității împotriva coccidiozei.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Termen de valabilitate – 3 ani

Termen de valabilitate după prima deschidere: 28 zile

Termen de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor: 24 ore

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.



13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane de 500 ml și 1000 ml, de culoare alba, din polietilenă de densitate înaltă, (HDPE), cu capac rotund și sigiliu din folie de aluminiu.

Nu toate dimensiunile ambalajelor pot fi comercializate.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12/2019

DISTRIBUITOR:

Agrimatco-Service SRL

81 Sciusev Str., Chisinau,

MD-2012, Moldova

Tel: + 373 22 210 969;

Fax: + 373 22 210 960

www.agrimatco.com

E-mail: agrimatco.moldova@agrimatco-eu.com

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

