

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Toltavet 2,5%, 25 mg/ml, soluție pentru administrare prin apă potabilă

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml conține:

Substanță activă:

Toltrazuril - 25 mg

Excipienți:

Pentru lista deplină a excipienților, vezi p. 6.1

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție pentru administrare prin apă potabilă.

Soluție vâscoasă de culoare galben pal spre maro pal.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Pui, curcani

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

-Pui: E.acervulina, E.brunetti, E.maxima, E.mitis, E.necatrix, E.tenella

-Curcani: E.adenoides, E.meleagrimitis

Toltavet acționează asupra tuturor stadiilor de dezvoltare intracelulară a Coccidelor.

4.3 Contraindicații:

A nu se administra păsărilor ouătoare.

A nu se administra păsărilor cu hipersensibilitate la substanța activă sau oricare din componenții medicamentului.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Măsurile de igienă ajută la reducerea riscului de coccidioză. Prin urmare, se recomandă în procesul tratamentului să se atragă o atenție deosebită la igiena și curățenia încăperii, precum și la reducerea umidității.

Se recomandă tratarea tuturor animalelor într-un padoc. Pentru rezultate reușite, tratamentul trebuie inițiat înainte ca semnele clinice ale bolii să se răspândească în întregul grup.



4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru administrare la animale:

În cazul oricărui agent antiparazitar, utilizarea frecventă și repetată a agenților antiprotozoici din aceeași clasă de substanțe active și subdozarea datorată subestimării greutateii corporale poate duce la dezvoltarea rezistenței. Este important să respectați doza recomandată pentru a minimiza riscul de rezistență.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu medicamentul, îmbracați mănuși din cauciuc.

Nu ingerați. În caz de ingestie accidentală, consultați de urgență medicul și arătați prospectul sau eticheta medicamentului.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu medicamentul.

Medicamentul de uz veterinar este o soluție alcalină.

În caz de contact direct cu ochii sau pielea, spălați abundent cu apă.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul administrării medicamentului.

Spălați-vă mâinile după utilizare.

4.6 Reacții adverse

Nu se cunosc

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat: -

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

Toltavet este compatibil cu antibioticele, cum ar fi Enroflaxacina, Ampicilina, Cloramfenicol, Furazolidon, Neomicina, Tetraciclina, Tiamulina, Tilozina, Kitasamycin, acceleratorii creșterii, cum ar fi Avoparcin, Flavomicin, Virginiamicin, Zn-Bacitracin, coccidiostaticele cu ionofor, coccidiostaticele chimice ca DOT, Coyden, Lerbek, Arprinocid și antiprotozoare, cum ar fi Dimetridazol, Iprnidazol și Ronidazol.

4.9 Doze și mod de administrare:

Pentru administrare pe cale orală.

7 mg de Toltrazuril/kg de masă corporală/ pe zi în decurs de 2 zile.

Această doză corespunde cu 28 ml de Toltavet la 100 kg de greutate corporală/ pe zi în decurs de 2 zile.

Această doză corespunde în mediu la 25 ppm de Toltrazuril în apă de băut pentru medicație continuă timp de 48 de ore sau la 75 ppm Toltrazuril în apă de băut administrată pentru 8 ore/ pe zi în decurs de 2 zile. (Această concentrație poate fi ajustată la volumul de apă consumat de păsări.)



Un tratament unic este complet eficient. În cazul unor infecții grave tratamentul poate fi repetat peste 5 zile.

4.10 Supradozare

O supradozare echivalentă cu 3 – 5 doze normale este tolerată fără simptome.

4.11 Perioada de așteptare:

- Păsări: Carnea de pasăre nu se va consuma în alimentație în perioada tratamentului și 21 de zile după ultima administrare.
- Nu se va administra păsărilor cu 14 zile înainte de ouat sau păsărilor care produc ouă pentru consumul uman.

5.PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupul farmacoterapeutic: – antiprotozoare, triazina

Codul ATC: OP51AJ01

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

Toltrazurul este un anticoccidial din grupul triazinetrionic, activ împotriva *Eimeria* spp. Toltrazurul induce modificări în structura fină a etapelor de dezvoltare a coccidiei. Acestea sunt cauzate în principal de inflamarea reticulului endoplasmatic și a aparatului Golgi, modificări anormale ale spațiului perinuclear și tulburări în diviziunea celulară. Toltrazurul determină o scădere a activității enzimelor din lanțul respirator la paraziți.

Toltavet nu influențează dezvoltarea imunității împotriva coccidiozei.

5.2 Proprietăți farmacocinetice:

Toltrazuril este absorbit de păsări cel puțin în proporție de 50% din doza consumată. Cele mai înalte concentrații se găsesc în ficatul și rinichii păsărilor. Substanța activă este defalcată rapid. Principalul metabolit este sulfatul de toltrazuril.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Excipienți

N-Metilpirolidonă

Trietanolamină

Polietilenglicol 400

6.2 Incompatibilități

In lipsa studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu se va combina cu alte medicamente de uz veterinar.



