

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Diacidol 60% ***(Concentrat emulsionabil)*** ***Ectoparazitoid*** ***Doar pentru uz veterinar***

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Mobedco-Vet

The Arab Pesticides And Veterinary Drugs Mfg. Co.

Telefax: 5354191/192/161/949

Produs în Iordania

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Diacidol 60%, concentrat emulsionabil

Compoziția:

Substanța(e) activă(e):

Diazinon 60% w/v

Lista excipienților:

Geronol FF/4 – 4,2%

Geronol MS 1,8%

Ulei de soia epoxidat -1%

Solvent aromatizant

Descrierea produsului:

Este un insecticid și acaricid organofosforic non-sistemic, care după contact acționează asupra căilor respiratorii și asupra sistemului digestiv al parazitului.



3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Diacidol este un ectoparazitoid de uz veterinar, care poate fi administrat tuturor animalelor de fermă și a celor domestice, cu excepția pisicilor și păsărilor.

Diacidol este folosit împotriva tuturor speciilor de insecte din încăperile animalelor, cum ar fi muște, purici, păduchi, molii, gândaci, ploșnițe, furnici și alte insecte.

Se folosește pentru prevenirea scabiei, căpușelor, păduchilor, puricilor la ovine, caprine, porcine, bovine și alte animale de fermă.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra animalelor bolnave, slabe, epuizate sau puilor de animale.

5. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc

6. SPECII ȚINTĂ

Ovine, caprine, porcine, bovine

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Se aplică prin metoda de pulverizare sau umezire.

Diacidol este folosit contra tuturor speciilor de insecte din încăperile animalelor, cum ar fi muște, purici, păduchi, molii, gândaci, ploșnițe, furnici și alte insecte.

Se folosește pentru prevenirea scabiei, căpușelor, păduchilor, puricilor la ovine, caprine, porcine, bovine și alte animale de fermă.

Doze și mod de administrare:

<i>Specie de animal</i>	<i>Pulverizare</i>	<i>Umezire</i>
Ovine, caprine, porcine	1 Lit./ 1000 litri de apă	1 Lit./ 2400 litri de apă
Bovine	1 Lit./ 1000 litri de apă	1 Lit./ 1000 litri de apă
Alte animale	1 Lit./ 1000 litri de apă	1 Lit./ 1000 litri de apă
Încăperile animalelor	1 Lit./ 25 litri de apă	

* Proportia de diluare la prepararea soluției pentru aplicarea prin umezire:

Ovine, caprine și porcine: 1:800

Bovine: 1:400

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne - 2 săptămâni, Lapte - 3 zile



9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lasa la îndemâna copiilor.

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină la temperaturi pînă la 25 C.

A se păstra departe de surse de căldură și foc.

A se păstra în recipiente originale, sigilate.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice deșeu provenit din utilizarea produsului veterinar se va elimina în conformitate cu cerințele autorităților locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (interdicții)

Toxic pentru pisici, pești, albiși și păsări.

Nu poluați sursele de apă.

Nu consumați produse alimentare și nu fumați în timpul aplicării.

Sticlele goale vor fi distruse în mod nepoluant, pentru a preveni influența lor nocivă asupra mediului.

Antidot și Tratatment Medical: Atropina, Toxogonin sau orice reactivator de colinesterază.

INTERDICTII: Nu se cunosc

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Termen de valabilitate: 2 ani de la data producerii

Termen de valabilitate după deschiderea ambalajului: 28 zile

Termen de valabilitate după reconstituire: 24 ore

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane (HDPE) de 100 ml; 1 litru

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

Octombrie 2019

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

