

Prospectul medicamentului de uz veterinar

Bolfo spray cutanat, soluție, 2,5 mg/g, pentru câini și pisici

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. Denumirea și adresa deținătorului certificatului de înregistrare și ale producătorului/fabricantului responsabil pentru eliberarea medicamentului de uz veterinar

Deținătorul:

Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen, Germania
www.bayer.ua

Producătorul:

KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH,
Projensdorfer str.324,
24106 Kiel, Germania

2. Denumirea medicamentului de uz veterinar, concentrația și forma farmaceutică ale acestuia

Bolfo spray cutanat, soluție, 2,5 mg/g, pentru câini și pisici

Fiecare g de produs conține:

Substanță activă:

Propoxur 10 mg/ml;

Excipienți:

Propan, Butan, Esență parfumată proaspătă HR 760712, Alcool izopropilic, Acid citric anhidru.

3. Indicații terapeutice (pe specie țintă)

Produsul este recomandat la câini și pisici în tratamentul ectoparazitozelor produse de purici și căpușe.

4. Contraindicații

Nu se utilizează la animalele cu hipersensibilitate la substanța activă sau excipienți.

Nu se utilizează la animalele bolnave sau în convalescență.

Nu se utilizează la câinii cu leziuni întinse ale pielii.

Nu se utilizează la căței și pisoii sub vârsta de 3 luni.

5. Reacții adverse

În cazuri rare, s-au observat că animalele mai sensibile prezintă hipersensibilitate și mâncărimi ale pielii după tratament.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

6. Specii țintă

Câini și pisici.

7. Posologie pentru fiecare specie, metoda, modul de administrare



Produsul se utilizează prin aplicare externă - sprayere, timp de câteva secunde pe toată suprafața corpului animalelor până când toată blana este umezită în totalitate. Aplicarea produsului se va face de la 50 cm distanță, în sens contrar creșterii firului de păr.

Recomandări privind administrarea corectă - pulverizați câteva secunde pe blana animalului împotriva sensului de creștere a părului până ce întreaga blană este umedă. Preveniți inhalarea de către animal.

8. Perioada de așteptare

Nu este cazul.

9. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.

A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje pentru animale.

A nu se folosi după data expirării înscrisă pe etichetă după expirare.

10. Precauții speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizat sau a deșeurilor provenite de la medicamentul de uz veterinar

Produsul veterinar fara eticheta, cu termenul de valabilitate expirat, deteriorate sau deschise, trebuie eliminate in conformitate cu cerintele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. Atenționări speciale

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Numai pentru uz extern.

Precauții speciale pentru utilizare

Atenție! Foarte inflamabil. Conține butan și propan. A nu se utiliza lângă foc deschis și a nu se fuma în timpul tratamentului. Flacon sub presiune. Este interzis a se deschide, a se lovi, a se expune radiațiilor solare sau a se arunca în foc după ce s-a golit.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Numai pentru uz extern. Preveniți inhalarea de către animal. În cazul în care produsul a fost înghițit accidental, pisica sau câinele va dezvolta semnele intoxicației cu carbamați, cum ar fi: salivare excesivă, contracții ale pupilelor, vomă sau diaree. În aceste cazuri consultați imediat medicul veterinar. Antidot: atropină sulfat.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Spălați-vă pe mâini după utilizare. Nu mâncați, nu beți sau nu fumați în timpul administrării produsului. La utilizarea produsului evitați contactul direct cu ochii, gura, nasul. În caz accidental de contact cu ochii, gura sau nasul clătiți imediat cu apă din abundență și consultați medicul veterinar. Antidot: atropină sulfat.

Utilizare în perioada de gestație, lactație

Pot fi tratate animalele în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu tratați câinele și pisica cu alte insecticide în același timp.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

În testele efectuate cu câini și pisici nu au fost observate semne de iritație după administrarea unei



doze duble față de doza recomandată. Supradozele repetate și înghițirea pot, totuși, conduce la semne de intoxicație cu carbamați la om și animale, cum ar fi: salivare excesivă, contracția pupilelor, vomă sau diaree. În aceste cazuri consultați imediat medicul veterinar. Antidot: atropină sulfat.

Incompatibilități

Nu se cunosc.

12. Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate 36 luni, de la data de fabricare.

Se interzice utilizarea produsului după data de expirare.

13. Statutul legal

Se eliberează fără prescripție veterinară

14. Natura și compoziția ambalajului primar

Flacoane din aluminiu cu 250 ml de soluție pentru pulverizare (spray).

15. Data ultimei revizuirii a textului

04/12/2019



Numai pentru uz veterinar