

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Bolfo spray cutanat, soluție, 2,5 mg/g, pentru câini și pisici

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare g de produs conține:

Substanță activă:

Propoxur 2,5 mg

Excipienți:

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6. 1 .

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Spray cutanat, soluție incoloră până la gălbui.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Câini și pisici

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Produsul este recomandat la câini și pisici în tratamentul ectoparazitozelor produse de purici și căpușe.

4.3 Contraindicații

Nu se utilizează la animalele cu hipersensibilitate la substanța activă sau excipienți.

Nu se utilizează la animalele bolnave sau în convalescență.

Nu se utilizează la câinii cu leziuni întinse ale pielii.

Nu se utilizează la căței și pisoi sub vârsta de 3 luni.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Numai pentru uz extern.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Atenție! Foarte inflamabil. Conține butan și propan. A nu se utiliza lângă foc deschis și a nu se fuma în timpul tratamentului. Flacon sub presiune. Este interzis a se deschide, a se lovi, a se expune radiațiilor solare sau a se arunca în foc după ce s-a golit.

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale

Numai pentru uz extern.



Preveniți inhalarea de către animal. În cazul în care produsul a fost înghițit accidental, pisica sau câinele va dezvolta semnele intoxicației cu carbamați, cum ar fi: salivare excesivă, contracții ale pupilelor, vomă sau diaree.

În aceste cazuri consultați imediat medicul veterinar. Antidot: atropină sulfat.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Spălați-vă pe mâini după utilizare.

Nu mâncați, nu beți sau nu fumați în timpul administrării produsului.

La utilizarea produsului evitați contactul direct cu ochii, gura, nasul.

În caz accidental de contact cu ochii, gura sau nasul clătiți imediat cu apă din abundență și consultați medicul veterinar. Antidot: atropină sulfat.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

În cazuri rare, s-au observat că animalele mai sensibile prezintă hipersensibilitate și mâncărimi ale pielii după tratament.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat.

Animalele gestante pot fi tratate cu acest produs.

Nu se va utiliza la animalele în lactație.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu tratați câinele și pisica cu alte insecticide în același timp.

4.9 Doza și calea de administrare

Produsul se utilizează prin aplicare externă - sprayere, timp de câteva secunde pe toată suprafața corpului animalelor până când toată blana este umezită în totalitate. Aplicarea produsului se va face de la 50 cm distanță, în sens contrar creșterii firului de păr.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

În testele efectuate cu câini și pisici nu au fost observate semne de iritație după administrarea unei doze duble față de doza recomandată. Supradozele repetate și înghițirea pot, totuși, conduce la semne de intoxicație cu carbamați la animale, cum ar fi: salivare excesivă, contracția pupilelor, vomă sau diaree. În aceste cazuri consultați imediat medicul veterinar. Antidot: atropină sulfat.

4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: Ectoparaziticide pentru uz topic, inclusiv insecticide, carbamați

Codul veterinar ATC: QP53AE02



5.1.2 Mecanism de acțiune

Insecticidele de tip carbamat prezintă o toxicitate moderată la mamifere, sunt metabolizate rapid și nu se acumulează în țesuturi.

Inhibarea colinesterazei este reversibilă și de scurtă durată.

5.2 Particularități farmacocinetice

Principalii metaboliți sunt: O-hidroxifenil N-metilcarbammat și 2-izopropoxifenol; ultimul regăsindu-se în urină ca glucuronid. Urina este probabil principala cale de eliminare a acestui compus.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Amestec propulsor propan/butan
Esență de parfum 760712 HR
Alcool izopropilic
Acid citric anhidru

6.2 Incompatibilități

Nu se cunosc.

6.3 Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 36 luni.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.
A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje pentru animale.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacoane din aluminiu cu 250 ml de soluție pentru pulverizare (spray).

6.6 Măsuri speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Flacon sub presiune. Este interzis a se deschide, a se lovi, a se expune radiațiilor solare sau a se arunca în foc după ce s-a golit.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen, Germania



8. NUMARUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

200016

9. DATA PRIMEI ELIBERARI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

(sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

27/03/2020

10. DATA REVIZUIRI TEXTULUI

10/12/2019

