

Persoanele care aplică soluția e necesar să folosească echipament de protecție (halat, mănuși, cizme din cauciuc).

Persoanelor hipersensibile la componentele preparatului li se recomandă evitarea contactului direct cu Ciflunit^R. În timpul lucrului se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi. La finisarea lucrului mâinile se spală cu apă și săpun.

În caz de contact accidental a preparatului cu pielea sau mucoasă oftalmică, acestea se spală din abundență cu apă. În caz de apariție a reacției alergice sau la îngerare, trebuie imediat de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul).

4.6 Racții adverse:

La administrarea preparatului Ciflunit^R conform prospectului reacții adverse și complicații nu apar. În caz de sensibilitate individuală sporită și apariția reacției alergice, animalului i se indică preparate antihistaminice și terapie simptomatică.

4.7 Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Se folosește vacilor gestante, celor în lactație li se aplică îndată după muls.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Ciflunit^R poate interacționa cu alte remedii insectoacaricide, deaceia nu se folosește împreună cu altele.

4.9 Doza și calea de administrare

4.9.1 Doze:

Pentru prelucrarea unui animal se administrează 10 ml de Ciflunit^R.

4.9.2 Mod de administrare:

Prelucrearea animalelor se efectuează de un medic veterinar, feldcer sau persoane special instruite sub supravegherea .

Cu ajutorul dozatorului Ciflunit^R se aplică pe pielea de pe spatele animalului, de-a lungul coloanei vertebrale.

Prelucrarea se efectuează în perioada pășunatului, o dată la 4-6 săptămâni (în dependență de numărul de insecte).

Durata acțiunii a produsului este de nu mai puțin de 28 zile de la o singură aplicare.

4.10 Supradozare

În caz de supradozare animalul poate manifesta apatie și scăderea apetitului.

4.11 Perioada de așteptare:

0 zile.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: ciflutrin(ciano-4(-fluoro-3-fenoxifenil)-metil-3-(202-dicloroetilil)-2,2-dimetil), substanță din grupa piretroidelor sintetice.

Cod ATC: QP53AC12

5.1.2 Mecanism de acțiune

Mecanismul de acțiune insecticidă constă în blocarea transmiterii impulsurilor nervoși, ceea ce duce la dereglarea coordonării mișcărilor (ataxie), paralizie și moartea parazitului.

5.1.3 Efecte farmacodinamice

Ciflutrin-substanța activă a preparatului Ciflunit^R posedă acțiune insecticidă de contact și repelentă, este activ contra dipterelor, inclusiv muștelor zoofile (*Haematobia iritans*, *Haematobia stimulans*, *Musca autumnalis*, *Stomoxys calcitrans*), contra tăunilor



(*Tabanidae*), tăunilor (*Hypodermatidae*), țințarilor (*Culicidae*) și muscuțitelor (*Simuliidae*).

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică:

Se recomandă respectarea termenilor recomandați a administrărilor pentru a nu diminua eficiența terapeutică.

În caz de omitere a unei sau mai multor doze, administrarea se reea în aceeași doză conform aceeași scheme.

5.2 Proprietăți farmacocinetice:

În urma aplicării pe piele, preparatul practic nu se absoarbe, dar se răspîndește pe suprafața corpului animal, ceea ce asigură o acțiune îndelungată insecticidă și repelentă.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Solvent *Shellsol A150* sau *Solvesso*TM 150 ND, 2-octildodecanol și parafină lichidă.

6.2 Incompatibilități:

Ciflunit^R poate interacționa cu alte remedii insectoacaricide, deaceia nu se folosește în asociere.

6.3 Perioada de valabilitate:

Cu respectarea condițiilor de păstrare-3 ani , după deschidere-60 zile. A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T⁰C + 8⁰C+25⁰C, în locuri inaccesibile copiilor.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacon din polimer a câte 10, 20, 50, 100 și 250 ml; 500 ml și 1 L în butelii din polimer cu capac filetat securizat. Flacoanele de 100 ml și buteliile de 500 ml sunt ambalate în cutii individuale din carton care conțin dozator și mănuși.

6.6 Măsuri speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar

neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Se interzice folosirea ambalajelor goale în scopuri casnice. Ambalajele se elimină cu deșeuri menajere.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

OOO" NITA-FARM", 410010, or. Saratov, str. Osipova V.I. 1
str. Țentralinaia 1. Tel/fax +7(4852)338-600
e-mail: client@nita-farm.ru

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

200084

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

(sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

12.08.2020

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

03.09.2019

