

Amara nr. 2

Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Picături insecto-acaricide Barrier Super

Picături pentru uz extern

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE:

Numele și adresa: SRL PRODUKT;

61093, or. Harkov, strada Skorohoda, 24; Ucraina

Telefon: +38 057 752-03-83

Fax: +38 057 752-03-84

e-mail: produkt.ltd@gmail.com

PRODUCĂTOR:

ÎP BARIERĂ-PROFI

61032, or. Harkov, Bulevardul Moscova, 309; Ucraina

Telefon/fax: +38 057 752-03-91

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Substanța(e) activă(e):

Fipronil80 mg/ml.

Lista excipienților:

Propilen glicol

Glicerină

Alcool izopropilic

3. INDICAȚII TERAPEUTICE:

Profilaxia și tratamentul câinilor și pisicilor în cazul afecțiunilor provocate de ectoparaziți: purici (*Ctenocephalus spp.*), căpușe (*Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Ixodes spp.*), păduchi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*).

De asemenea, medicamentul este eficient și în cazul râii auriculare (otodectoză).



4. CONTRAINDICAȚII:

Hipersensibilitate față de fipronil sau alte elemente componente de bază ale medicamentului.

Nu utilizați medicamentul în cazul pisicilor mici cu vârsta de până la 12 săptămâni, câinilor mici cu vârsta de până la 10 săptămâni și concomitent cu alte produse insecto-acaricide.

Nu se recomandă utilizarea medicamentului în cazul animalelor extenuate, bătrâne și în cazul sarcinii și alăptării.

5. REACȚII ADVERSE:

Iritarea ușoară poate fi observată rapid la locul de aplicare.

În cazul unei reacții alergice la un animal sensibil la substanța activă, medicamentul trebuie spălat complet cu săpun și multă apă curgătoare, iar tratamentul simptomatic trebuie efectuat, dacă este necesar.

6. SPECII ȚINTĂ:

Câini, pisici

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ:

Medicamentul este pentru uz extern, se aplică nemijlocit pe piele cu fiola-pipetă, în locurile inaccesibile pentru lins: câinilor în regiunea greabăului și de-a lungul spinării, iar pisicilor în zona cefei în următoarele doze:

Căței și pisicile mici: 0,5 ml medicament;

Pisicilor: 1 ml medicament;

Câinilor: greutatea corpului 2-10 kg - 1 ml medicament;

greutatea corpului 10-20 kg - 2 ml medicament;

greutatea corpului 20-40 kg - 3 ml medicament;

greutatea corpului mai mare de 40 kg - 4 ml medicament.

Medicamentul se aplică o singură dată. Efectul profilactic se păstrează în decurs de 1,5-2 luni. La încheierea acestui termen prelucrarea poate fi repetată.

În tratamentul otodectozei, medicamentul este îngropat în canalul auditiv extern la o doză de 2-3 picături. Prelucrarea se realizează de 2-3 ori cu un interval de 8-10 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE:

Nu este reglementat

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

Într-un loc uscat și întunecat la o temperatură care nu depășește 25 °C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau expirat este eliminat în conformitate cu legislația în vigoare.



11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (interdicții)

Deschideți ambalajul numai înainte de procesarea.

Nu scăldați și nu periați animalul în decurs de 48 de ore de la tratament.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR:

3 fiole-pipete polimerice de 0,5 ml (pentru cățee și pisicile mici) și 1 ml (pentru câinii adulți și pisicile adulte) într-o cutie de carton.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

11/2020

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

