

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Șampon Barrier Super antiparazitar universal pentru câini

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Substanța activă:

Diazinon 0,114 mg/ml.

Excipienți:

Șampon

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Șampon cu medicament

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Câini

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă:

Profilaxia și tratamentul câinilor în cazul afecțiunilor provocate de ectoparaziți: purici (*Ctenocephalus spp.*), căpușe (*Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Ixodes spp.*), păduchi și malofagi (*Haematopinus canis*, *Trichodectes canis*); îngrijirea igienică a pielii și blănii animalelor.

4.3 Contraindicații:

Hipersensibilitate individuală a animalului la diazinon sau alte componente ale medicamentului.
Nu utilizați medicamentul pentru cățeluși cu vârsta de până la 4 săptămâni.
Nu utilizați medicamentul la animale bolnave, epuizate și bătrâne.
Nu utilizați medicamentul pentru animale însărcinate și care alăptează.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Caracteristici de acțiune a medicamentului "Șampon Barrier Super antiparazitar universal pentru câini" în timpul primei utilizări și după anularea medicamentului, la câini nu au fost observate.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Protejați ochii și urechile animalului de șampon și apă

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Atunci când lucrați cu medicamentul, este necesar să respectați regulile de bază de igienă și siguranță adoptate atunci când lucrați cu medicamente veterinare.





Tratamentul animalelor cu medicamentul trebuie efectuat în mănuși de cauciuc, la sfârșitul lucrării, mâinile trebuie spălate complet cu apă și săpun.

Evitați contactul cu pielea și ochii. Dacă medicamentul ajunge accidental pe piele sau pe mucoase, acesta trebuie imediat spălat cu apă curentă.

4.6 Reacții adverse:

În cazul unei reacții alergice la un animal sensibil la substanța activă, medicamentul trebuie spălat complet cu o cantitate mare de apă curentă și, dacă este necesar, trebuie efectuat un tratament simptomatic.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se aplică

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu utilizați medicamentul în același timp cu alte insecticide.

Substanța activă a medicamentului este incompatibilă cu morfină și aminofilină.

4.9 Doză și calea de administrare:

4.9.1 Doze:

0,5-1 ml per 1 kg greutate corporală

4.9.2 Mod de administrare:

Aplicați o cantitate mică de șampon pe parul umed al animalului (0,5-1 ml per 1 kg greutate corporală), așteptați 10-15 minute, prevenind linsul șamponului de animal, apoi spălați foarte bine cu apă caldă.

În cazul infecției cu păduchi, tratamentul animalelor se repetă de 2 ori la interval de 7-10 zile.

4.10 Supradozare:

După o supradoză ușoară, au fost raportate următoarele efecte: salivare, mers rigid, vărsături și depresie.

În leziunile severe ale pielii, utilizarea topică a diazinonului poate duce la absorbția excesivă a pielii și la dezvoltarea simptomelor parasimpatice.

După ingestia accidentală sau o supradoză masivă a pielii, apare o intoxicație acută.


Principalele simptome ale intoxicației cu diazinon sunt salivarea, lăcrimarea, îngustarea pupilelor, vărsăturile, diareea, bradicardia, bronhospasmul, tremorul muscular, lipsa coordonării mișcărilor, paralizia.

În caz de supradoză accidentală, principalul tratament este întreruperea medicamentului și utilizarea terapiei simptomatice. În caz de supradoză accidentală, pielea animalului trebuie spălată cu multă apă. După înghițirea accidentală, se recomandă spălare gastrică, precum și cărbune activ și laxative. Atropina (un medicament parasimpatolitic) este antidotul pentru simptomele muscarinice acute, cele mai periculoase. Este un antagonist al acetilcolinei în receptorii muscarinici ai sistemului nervos.

4.11 Perioada de așteptare:

Nu este reglementat





Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

Substanța activă a medicamentului diazinon aparține grupului de compuși organofosforici, esteri ai acidului tiofosforic.

Diazinon este un insecticid organofosforic de contact, cu o gamă largă de activitate insecticidă. Este eficient împotriva formelor adulte și tinere de insecte zburătoare, insecte târătoare, acari și păianjeni.

Diazoxonul, metabolitul biologic activ al diazinonului, inhibă activitatea colinesterazelor

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică:

ATCvet QP53A, ectoparazițicide pentru uz topic; QP53AF15, diazinon.

5.1.2 Mecanism de acțiune:

Diazinonul blochează nervii ganglionari periferici ai parazitului, provocând o neurointoxicație urmată de dereglarea coordonării mișcărilor, paralizie, letargie și moarte.

5.1.3 Efecte farmacodinamice:

Gama de acțiuni a diazinon: purici (*Ctenocephalus spp.*), căpușe (*Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Ixodes spp.*, *Otodectes cynotis*), păduchi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*).

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică:

Medicamentul a prezentat o eficiență ridicată (87-95%) în tratamentul bolilor de etiologie parazitară la câini. Nu au fost detectate reacții adverse, complicații, manifestări de intoxicație la animale în timpul utilizării medicamentului.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

Absorbția transdermică a diazinonului administrat local depinde de specia animală, de doza administrată și de suprafața suprafeței corpului tratat. De regulă, numai o cantitate relativ mică este absorbită după injecția topică.

Diazinonul absorbit este absorbit semnificativ în fluxul sanguin și este metabolizat rapid. Timpul de înjumătățire plasmatică al diazinonului este de aproximativ 12 ore. Aproximativ 58% este excretat în urină în primele 24 de ore după administrare, mai mult de 85% sub formă de diverși metaboliți.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Șampon

6.2 Incompatibilități:

Nu utilizați medicamentul în același timp cu alți agenți insecticide.

6.3 Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate a medicamentului este de 2 ani.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

Într-un loc uscat și întunecat la o temperatură care nu depășește 35 °C.





Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63

ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

APROBAT

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Pachetele polimerice x 15 ml, flacoane polimerice x 200, 275, 300 ml.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau expirat este eliminat în conformitate cu legislația în vigoare.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Numele și adresa: SRL PRODUKT;

61093, or. Harkov, strada Skorohoda, 24; Ucraina

Telefon: +38 057 752-03-83

Fax: +38 057 752-03-84

e-mail: produkt.ltd@gmail.com

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

200125

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

24.11.2020

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

11/2020

