

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**SULFATRIM** – soluție orală pentru pui, curcani și iepuri

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Chemifarma S.p.A. - via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì (Italia).

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

SULFATRIM, soluție orală pentru pui, curcani și iepuri.

1 ml soluție conține:

Substanța activă:

Trimetoprim	40	mg
Sulfadimetoxina	200	mg
<i>Excipienți: pină la</i>	1,00	ml

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Pui: Infecții respiratorii și urogenitale.

Curcani: Infecții respiratorii și urogenitale.

Iepuri: Infecții respiratorii și urogenitale susținute de microorganisme Gram+ pozitive și Gram-negative sensibile la sulfamide.

4. CONTRAINDICAȚII





Nu administrați pentru o perioadă lungă de timp. Nu administrați animalelor sensibile la sulfonamide. Nu administrați la găini ouătoare.

5. REACȚII ADVERSE

La subiecții sensibili pot apărea unele cazuri anafilactice.

6. SPECII ȚINTĂ

Pui, curcani și iepuri.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Înlocuiți apa reziduală din adapători cu apa medicamentată. Împărțiți doza zilnică în două părți egale și administrați tratamentul la fiecare 12 ore. Se recomandă să nu administrați apa înainte de începerea tratamentului, pentru a înseta animalele.

Pui, curcani și iepuri: în apa de băut 10.0 – 20.0 g/100 kg greutate vie (echivalent cu 2.0 - 4.0 g sulfadimetoxina + 0.4 – 0.8 g trimetoprim/100 kg g.v.) în funcție de vîrstă, greutate și consumul de apă al animalelor, timp de 5-6 zile consecutiv.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Pui: 8 zile.

Curcani: 7 zile.

Iepuri: 11 zile.

Nu administrați găinilor ouătoare care produc ouă pentru consumul alimentar uman.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Protejați de razele soarelui.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Eliminați în conformitate cu regulamentele regionale și naționale în vigoare.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizarea la animale

Nu exista.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Evitați contactul direct cu medicamentul în timp ce îl manipulați.

Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului

Nu administrați animalelor care produc ouă pentru consumul alimentar uman.



Interacțiuni

Nu există.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Valabilitatea medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni

Valabilitatea medicamentului după prima deschidere a ambalajului primar: 30 zile.

Valabilitatea medicamentului după diluare în apă: 12 ore.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane de 100 ml și 1 litru din polietilenă, închise cu un capac de siguranță.

Bidoane de 5 l din polietilenă, închise cu un capac de siguranță.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

02/2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

