



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ANTIVARO

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

ANTIVARO

O bandă conține substanța activă:

flumetrină – 3,6 mg.

Excipient: dimetilsulfoxid.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Prevenirea și tratamentul varoozei la albine.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza concomitent cu alte medicamente împotriva varoozei.

A nu se utiliza în timpul perioadelor de cules.

5. REACȚII ADVERSE

Lipsesc.





6. SPECII ȚINTĂ

Albine melifere.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Benzile se scot din ambalaj imediat înainte de utilizare și se agață între faguri – câte o bandă peste fiecare două rame.

Prelucrarea familiilor de albine cu Antivaro se efectuează:

la începutul primăverii – când larvele, prepupele și pupele în familiile de albine ocupă un spațiu nesemnificativ;

vara – la sfârșitul lunii iulie - începutul lunii august, când matcile depun ouă într-o măsură limitată, spațiul cu larve, prepupe și pupe este nesemnificativ, iar restul spațiului este umplut cu miere și majoritatea căpușelor femele se află pe albine. Prelucrarea se efectuează imediat după extracția mierii cu centrifuga din principala sursă meliferă;

toamna – în septembrie, când spațiul cu larve, prepupe și pupe de albine scade semnificativ.

Pentru diagnosticarea varoozei podeaua stupului se acoperă cu o coală albă de hârtie, îmbibată cu grăsime, se lasă benzile în stup timp de 24 de ore, iar apoi se verifică dacă pe coală există căpușe moarte.

Medicamentul prezintă cea mai bună eficiență dacă este utilizat la sfârșitul verii după colectarea mierii.

Doza de medicament depinde de puterea familiilor de albine și constituie:

la roiuri și familii slabe – 1-4 benzi;

la familii normal dezvoltate și puternice – 2-4 benzi.

Benzile se lasă în stup timp de 35 de zile, dar nu mai mult de 6 săptămâni.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

0 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat, întunecat, inaccesibil copiilor, departe de surse de încălzire și foc, la temperatura de la 0 °C până la +30 °C. A se păstra separat de alimente, băuturi și hrana animalelor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.



11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu deschideți ambalajul decât imediat înaintea utilizării.

După utilizarea medicamentului spălați-vă pe mâini cu apă și săpun.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pungi din peliculă de polimer, care conțin 4 sau 10 benzi de lemn.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

02/2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

