

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR ANTIVARO

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

2.1 Descriere generală.

Benzi de lemn de culoare de la galben deschis până la maro cu miros specific.

2.2 Compoziția calitativă și cantitativă

Substanța activă: O bandă conține substanța activă:

Flumetrină – 3,6 mg.

Excipient:

Dimetilsulfoxid.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Benzi de lemn.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Albine melifere.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Prevenirea și tratamentul varoozei la albine.

4.3 Contraindicații:

A nu se utiliza concomitent cu alte medicamente împotriva varoozei.

A nu se utiliza în timpul perioadelor de cules.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Nu deschideți ambalajul decât imediat înaintea utilizării.

După utilizarea medicamentului spălați-vă pe mâini cu apă și săpun.

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A nu se utiliza în timpul perioadelor de cules.





4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul utilizării medicamentului este necesar să se respecte regulile generale de igienă personală și de tehnică a securității prevăzute în timpul lucrului cu medicamente de uz veterinar. După utilizarea medicamentului mâinile trebuie spălate cu săpun.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):

Lipsesc.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se aplică.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se utiliza concomitent cu alte medicamente împotriva varoozei.

4.9 Doză și calea de administrare

Benzile se scot din ambalaj imediat înainte de utilizare și se agață între faguri – câte o bandă peste fiecare două rame.

Prelucrarea familiilor de albine cu Antivaro se efectuează:

la începutul primăverii – când larvele, prepupele și pupele în familiile de albine ocupă un spațiu nesemnificativ;

vara – la sfârșitul lunii iulie - începutul lunii august, când matcile depun ouă într-o măsură limitată, spațiul cu larve, prepupe și pupe este nesemnificativ, iar restul spațiului este umplut cu miere și majoritatea căpușelor femele se află pe albine. Prelucrarea se efectuează imediat după extracția mierii cu centrifuga din principala sursă meliferă;

toamna – în septembrie, când spațiul cu larve, prepupe și pupe de albine scade semnificativ.

Pentru diagnosticarea varoozei podeaua stupului se acoperă cu o coală albă de hârtie, îmbibată cu grăsime, se lasă benzile în stup timp de 24 de ore, iar apoi se verifică dacă pe coală există căpușe moarte.

Medicamentul prezintă cea mai bună eficiență dacă este utilizat la sfârșitul verii după colectarea mierii.

Doza de preparat depinde de puterea familiilor de albine și constituie:

la roiuri și familii slabe – 1-4 benzi;

la familii normal dezvoltate și puternice – 2-4 benzi.

Benzile se lasă în stup timp de 35 de zile, dar nu mai mult de 6 săptămâni.

4.10 Supradozare:

Lipsesc.

4.11 Perioada de așteptare:

0 zile.





5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică:

ATC vet QP53AC05, flumetrină

Substanța activă a medicamentului – flumetrina – este un piretroid sintetic, care manifestă o acțiune acarică de contact sigură împotriva acarianului *Varroa spp.*, agentului etiologic al varoozei și nu dăunează albinelor.

Mecanismul de acțiune al flumetrinei constă în blocarea transmiterii impulsurilor nervoase, provocând perturbarea coordonării mișcărilor, paralizie și moartea căpușelor.

După aplicarea medicamentului substanța activă se elimină în permanență din banda de lemn, răspândindu-se în interiorul stupului. Flumetrina are un efect extrem de selectiv împotriva acarianului *Varroa jacobsoni* și nu dăunează albinelor melifere.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Benzi din lemn

6.2 Incompatibilități:

A nu se utiliza concomitent cu alte medicamente împotriva varoozei.

6.3 Perioada de valabilitate:

2 ani.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra la loc uscat, întunecat, inaccesibil copiilor, departe de surse de încălzire și foc, la temperatura de la 0 °C până la +30 °C.


6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Pungi din peliculă de polimer, care conțin 4 sau 10 benzi de lemn.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.





7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, Ucraina, 23500

tel.: +38 (043) 442-12-54, fax: +38 (043) 442-17-87

e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE:

210008

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

09.02.2021

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

02/2021

