

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Amit forte

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
 - Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
 - Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
 - Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.
 - Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră.
- Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "NVȚ Agrovetzașcita S-P",

141300, Rusia, reg. Moscova, or. Serghev Posad, str. Tsentralnaia 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Amit forte - soluție pentru uz extern

1 ml de soluție conține:

Substanța activă:

Fipronil - 1,0 mg, dimedrol - 5,0 mg, diflubenzuron - 0,5 mg

Excipienți:

Dimetilsulfoxid și polietilenglicol 200.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Amit forte se indică câinilor și pisicilor de la vârsta de 8 săptămâni în tratamentul sarcoptozei, notoendrozei, otodectozei, cheiletielozei și demodecozei.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită la componentele medicamentului.


A nu se administra animalelor bolnave de boli infecțioase, epuizate, în convalescență, la motănași și căței cu vârsta sub 8 săptămâni, animalelor productive.

Este contraindicată aplicarea auriculară a medicamentului (în otodectoză) în cazul timpanului perforat.

5. REACȚII ADVERSE

În doze terapeutice (conform prospectului dat) nu provoacă reacții adverse.





În caz de sensibilitate individuală sporită și apariția reacției alergice, administrarea se stopează și se indică terapie desensibilizantă.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

În cazul sarcoptozei, cheiletielozei sau demodecozei la câini, a notoedrozei pisicilor - Amit forte se aplică pe suprafețele afectate eliberate de cruste, uniform pe toată suprafața afectată și 1 cm de țesut limitrof (de la periferii spre centru). Pentru evitarea îngrășării, animalelor se fixează botnița sau guler de protecție care se scoate peste 15 - 20 minute după aplicare.

Prelucrările se efectuează de 2 - 5 ori, cu interval de 5 - 7 zile, până la însănătoșirea animalului ce se adevărește cu două rezultate negative a examenului acarologic de laborator.

Animalele cu suprafețe mari afectate, se prelucreează în două etape cu interval de 1 zi, aplicînd mai întâi pe o parte a corpului, apoi pe cealaltă.

În cazul acarozelor asociate cu infecții bacteriene sau micotice se recomandă tratament în complex cu imunomodulatoare și antibacteriene conform instrucțiunilor.

Tratamentul otodectozelor (rîie auriculară) la câini și pisici, presupune curățarea conductului auditiv de cruste și picurarea a 3 - 4 picături de medicament (în dependență de talia animalului) în fiecare ureche. Pentru o prelucrare mai uniformă, pavilionul urechii și baza lui se masează ușor. Pentru evitarea stropilor (la scuturarea din cap a animalului) e de dorit să fie fixat capul pentru cîteva minute, picăturile de pe blana animalului se șterg minuțios.

Administrarea se efectuează de 2 ori cu interval de 7-10 zile.

În cazul otitelor, se indică antibacteriene și antiinflamatoare. Cura de tratament se repetă pînă la însănătoșirea animalului care se adevărește cu două rezultate negative a examenului acarologic de laborator.

Este necesar ca Amit Forte să fie aplicat în ambele urechi, chiar și în cazurile cînd este afectată de otodectoză o singură ureche.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la $T^{\circ}C$ $0^{\circ}C+25^{\circ}C$, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșerte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.



11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

-Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu se folosește la animale cu timpanul perforat și la tineret cu vârsta sub 8 săptămîni.

-Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează

În timpul lucrului cu Amit forte e necesar de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Persoanelor hipersensibile la componentele medicamentului li se recomandă evitarea contactului direct cu Amit forte. În caz de contact accidental a medicamentului cu pielea sau tunicile mucoase oftalmice, ele se spală din abundență cu apă.

În caz de apariție a reacției alergice sau la îngerare, e important de adresat la o instituție medicală cît de repede posibil (cu sine de avut eticheta sau prospectul). În timpul lucrului se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi. La finisarea lucrului mîinile se spală cu apă și săpun. Nu se permite contactul cu animalul și accesul lui la copii mici timp de 24 ore după prelucrare.

-Utilizarea în perioada de gestație și lactație

Nu se folosește femelelor gestante și în lactație.

-Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Poate fi administrat în asociere cu antibacterienile, antimicoticele și antiinflamatoarele.

-Supradozare

În caz de supradozare sau îngerare se poate manifesta salivă abundentă, tremor muscular, vomă. Remedii specifice de detoxifiere lipsesc, se recurge la metode generale de eliminare a medicamentului din organism.

Incompatibilități:

Nu se indică concomitent cu alte acaricide.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere-28 de zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pipetă-picurător din polimer a cîte 1,0 și 1,4 ml; flacon din sticlă a cîte 10 ml cu dop din cauciuc și capac din aluminiu, a cîte 15, 20 și 30 ml flacoane cu picurător din polimer și capac filetat.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

05/2021

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL "Zoofarmagro", mun. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

