

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

BROVADAZOL™

Pulbere

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "Brovafarma", Ucraina, or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Brovadazol™ - pulbere microgranulată, pentru uz intern.

1 g de pulbere conține:

Substanță activă:

Fenbendazol - 50 mg

Excipienți:

Carbonat de calciu, lactoză, glucoză, amidon.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Dehelmintizarea în grup sau individual a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, cabalinelor, animalelor carnivore de blană, găinilor, găștelor în cazul infestării cu nematode (mature și imature), unele cestode și trematode.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra concomitent cu medicamentele contra fasciolozei, precum și timp de 7 zile după tratament cu bromsalanele.

5. REACȚII ADVERSE

În doze terapeutice (conform prospectului dat) nu provoacă reacții adverse.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, animale carnivore de blană, găini, găște.



7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

BrovadazolTM se administrează animalelor în doze indicate în tabel, în grup sau individual, 1 dată, dimineața, în amestec cu nutrețuri concentrate.

Specia animalului și denumirea helmintozei	Doza (mg/kg masă corp)		
	Brovadazol	SA	Numărul de administrări
Bovine:			
Dictiocauloză, strongilatoză, strongiloidoză	200	10	O dată
Dicrocelioză	660	33	O dată
Cisticercoză	500	25	3 zile consecutive
Ovine, caprine:			
Invazie mixtă de nematode	300	15	O dată
Dictiocauloză	200	10	O dată
Moniezioză	200	10	O dată
Trihuroză	300	15	2 zile consecutive
Echinococoză, cenuroză	800	40	3 zile consecutive
Dicrocelioză	440	22	2 zile consecutive
Porcine:			
Ascaroză	150	7,5	2 zile consecutive
Trihuroză	200	10	2 zile consecutive
Esofagostomoză și strongiloidoză	200	10	O dată
Invazie mixtă: Purcei de la 2 la 8 săptămîni Șeptel de prăsilă	20 150	1 7,5	O dată în săptămîină 2 ori pe zi
Cabaline:			
Parascaridoză+strongilatoză	300	15	O dată
Strongiloidoză (mînji de 1-2 luni)	160	8	2 zile consecutive
Carnasiere și animale de blană:			
Invazie mixtă	300	16	O dată
Găini: per cap			
Ascaridioză	100	5	2 zile consecutiv
Ascaridioză+heterachidoză	200	10	O dată
Gîște: per cap			
Invazie mixtă	800	40	O dată

În cazul dehelmintizării în grup, cantitatea medicamentului se mărește cu 5 %.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carcase bovine, ovine, caprine, porcine - 10 zile; păsări - 3 zile; subprodusele se dau în consum uman peste - 20 zile de la ultima administrare; lapte-2 zile.



9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și nutrețuri, la T°C pînă la +25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Se recomandă respectarea termenilor recomandați a administrărilor pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei sau mai multor doze, administrarea se reea în aceeași doză conform aceeași scheme. Nu se folosește dozaj dublu în locul celui omis.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Brovadazol™ e necesar de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Persoanelor hipersensibile la componentele medicamentului li se recomandă evitarea contactului direct cu Brovadazol™. În caz de contact accidental a medicamentului cu pielea sau tunicile mucoase oftalmice, ele se spală din abundență cu apă. În caz de apariție a reacției alergice sau la ingerare, e important de adresat la o instituție medicală cît de repede posibil (cu sine de avut eticheta sau prospectul).

În timpul lucrului se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi.

La finisarea lucrului mînilor se spală cu apă și săpun.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu sunt restricții.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se folosi concomitent cu medicamente de uz veterinar contra fasciozei.

Supradozare

Nu sunt cazuri înregistrate. Deoarece este puțin toxic.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pachet din polimer a cîte 10; 100 și 1000 g.





Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
INREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

05/2021

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL "Zoofarmagro", mun. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373-022-855-073; zoofarmagro@mail.ru



NUMAI PENTRU UZ VETERINAR