

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

PESTORIN

suspensie injectabilă

vaccin contra bolii hemoragice a iepurelui

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Bioveta, a.s.

Komenskeho 212

68323 Ivanovice na hane,

Republica Cehă

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Pestorin suspensie injectabilă pentru iepuri

Vaccin contra bolii hemoragice a iepurelui.

O doză (1 ml) conține:

Substanța activă :

Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculus) minim 80* .

*Titru de inhibare a hemaglutinării anticorpilor în urma vaccinării animalelor de laborator (iepuri).

Adjuvant: Hidroxid de aluminiu

Excipienți:

Soluție salină tamponată cu fosfat, Saponină, Formaldehidă, Tiomersal.


3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Se indică pentru imunizarea preventivă a iepurilor clinic sănătoși împotriva bolii hemoragice.

Debutul imunității: 10 zile după vaccinare.

Durata imunității: 1 an după vaccinare.





4. CONTRAINDICAȚII

A nu se vaccina animalele bolnave și cahectice. Femelele în ultima săptămână de gestație.

5. REACȚII ADVERSE

Vaccinarea nu provoacă reacții adverse locale sau generale.

6. SPECII ȚINTĂ

Iepiri.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Se administrează 1,0 ml de vaccin subcutanat, indiferent de greutatea animalului.

Animalele sunt vaccinate începând cu vârsta de 10 săptămâni.

În dependență de situația epizootică, vaccinarea poate fi efectuată de la vârsta de 6 săptămâni, revaccinarea este necesară după 1 lună.

Imunitatea se instalează la 10 zile după vaccinare și se menține 12 luni.

Pentru menținerea imunității stabile revaccinarea se recomandă anual în efectivele de reproducere.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

7 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2 °C - 8 °C).

A se feri de îngheț și lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Vaccin nefolosit timp de 10 ore de la deschidere, se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Se vaccinează iepurii de la vârsta de 10 săptămâni.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele D-ră.

Nu trebuie să-l dai altor persoane, care îl pot folosi greșit.

Înainte de utilizare conținutul flaconului trebuie să ajungă treptat pînă la temperatura +15 +25 °C și agitat bine.



Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Pectorin suspensie injectabilă pentru iepuri-vaccin contra bolii hemoragice a iepurelui, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu vaccin.

Se recomandă folosirea echipamentului de protecție (mănuși din neopren, haine de protecție) când se manipulează vaccin.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu se vaccinează femelele în ultima săptămână de gestație din cauza posibilității de avort spontan indus de manipularea dură.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nici o informație nu este disponibilă privind siguranța și eficacitatea acestui vaccin când se folosește cu alte medicamente de uz veterinar. O decizie privind folosirea acestui vaccin înainte sau după alte medicamente de uz veterinar trebuie luată de la caz la caz.

Vaccinul poate fi administrat simultan cu alte vaccinuri care se administrează s.c. cum ar fi vaccinul contra mixomatozei (conform instrucțiunii de folosire a producătorului Bioveta, a.s.). Cele două vaccinuri ne se amestecă.

Supradozare

Doza dublă nu provoacă efecte secundare.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest vaccin nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

12. PERIODA DE VALABILITATE

În ambalajul original al producătorului, cu respectarea condițiilor de păstrare - 2 ani.

După prima deschidere - 10 ore.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon a câte 1 doză, 10 doze, 20 doze și 50 doze.

Nu toate ambalajele pot fi disponibile.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

06/2021

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”,

m. Chișinău, str. Camenița 4a

tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru



NUMAI PENTRU UZ VETERINAR