

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Pasorin OL emulsie injectabilă

vaccin inactivat contra pasteurelozei la iepuri

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Bioveta, a.s.

Komenskeho 212

68323 Ivanovice na Hane,

Republica Cehă

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Pasorin-OL-emulsie injectabilă-vaccin inactivat contra pasteurelozei la iepuri .

O doză (1,0 ml) conține în calitate de substanțe active: suspensie *Pasteurella multocida* A,D min. 1.10^{10} și excipienți : formaldehidă 35%- max. 0,1 mg, thiomersal – 0,0595-0,0805 mg și ulei emulsionat-pînă la 1 ml.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Se indică pentru vaccinarea preventivă împotriva pasteurelozei la iepuri.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se folosi la animalele bolnave.

5. REACȚII ADVERSE

În urma vaccinării poate apărea o ușoară inapetență care dispare în 24-48 ore.

În locul injectării poate apărea o tumefiere de 0,5 cm sau în cazuri excepționale de 3 cm.

6. SPECII ȚINTĂ

Iepuri.



7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Vaccinul Pasorin OL- emulsie injectabilă se administrează subcutanat iepurilor de la vârsta de 4 săptămîni.

Iepuri 4-6 săptămîni - 0,5 ml;

Iepuri mai mari de 7 săptămîni - 1 ml.

Schema de vaccinare recomandată:

- 1-a doză- în 4- săptămîna de viață
- 2-a doză-în 7-a săptămîna de viață
- 3-a doză-în 10-a săptămîna de viață (animale de reproducere).

Pentru menținerea imunității, se vaccinează regulat la fiecare 6 luni.

Iepurii mai mari de 4 săptămîni, se vor vaccina de 2 ori cu interval de 3 săptămîni și apoi la fiecare 6 luni.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

10 zile de la ultima administrare.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemîna copiilor.

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (+2 °C +8 °C).

A nu se congela.

A se proteja de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Se vaccinează iepurii de la vârsta de 4 săptămîni.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Pasorin-OL aparține grupului de vaccinuri bacteriene inactivate care, de obicei, nu provoacă efecte nedorite. Tratamentul simptomatic este recomandat în caz de reacție anafilactică.

Înainte de utilizare, conținutul flaconului trebuie încălzit la o temperatură cuprinsă între 15 ° C și 25 ° C și bine agitat.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Pasorin OL-emulsie injectabilă, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu vaccin.

Se recomandă folosirea echipamentului de protecție (mănuși din neopren, haine de protecție) cînd se manipulează cu vaccin.



Pentru utilizator:

Acest vaccin conține ulei mineral.

Autoinjectarea/injectarea accidentală poate provoca dureri puternice și umflături, în special dacă injectarea se face în articulație sau în deget, iar în cazuri rare poate duce la pierderea degetului afectat, dacă nu se acordă asistență medicală promptă.

În cazul unei injectări accidentale cu acest produs medicinal veterinar, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta medicamentului, chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de produs. Dacă durerea persistă mai mult de 12 ore după examinarea medicală, solicitați din nou sfatul medicului.

Pentru medic:

Acest produs medicinal veterinar conține ulei mineral.

Chiar dacă s-au injectat cantități mici, injectarea accidentală cu acest produs poate provoca umflături intense, care pot duce, de exemplu, la necroza ischemică și chiar pierderea unui deget.

Imediat este necesară atenție chirurgicală și poate necesita incizie din timp și irigarea zonei injectate, în special acolo unde există implicare a pulpei degetului sau a tendonului.

Utilizarea în perioada de gestație și alăptare

Produsul poate fi utilizat în timpul gestației.

La femele poate scădea fertilitatea cu până la 15%.

Studii asupra iepuroaicelor în lactație nu s-au făcut.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Vaccinul poate fi administrat în aceeași zi cu vaccinul Pestorin Mormyx.

12. PERIODA DE VALABILITATE

În ambalajul original al producătorului, cu respectarea condițiilor de păstrare-24 luni.

După prima deschidere -10 ore.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon de sticlă a câte 20 ml; 5*20 ml; 1*100 ml.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

06/2021

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a

tel/fax +373 022 855-071; Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

