

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Clorură de sodiu 0,9% soluție perfuzabilă

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml de preparat conține:

Substanța activă:

Clorură de sodiu - 9,0 mg

Excipienți:

Apă pentru injecții.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție perfuzabilă.

Soluție transparentă incoloră.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă:

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Se indică în tratamentul animalelor în cazul deshidratărilor semnificative (intoxicări, diaree, intervenții chirurgicale, arsuri, dispepsie, hipotensiune sangvină, stare de șoc).

Se folosește la sanarea plăgilor, cavității bucale sau nazale, mucoasei oculare și în calitate de diluant pentru medicamente compatibile sau biopreparate.

4.3 Contraindicații:

Perfuzii în doze maxime sunt contraindicate în cazul dereglării circuitului sangvin, pericol de edem pulmonar sau cerebral.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Înainte de administrare, medicamentul este încălzit la o temperatură de 35-38 ° C.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu preparatul Clorură de sodiu 0,9% soluție perfuzabilă e necesar de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.



4.6 Reacții adverse:

În urma administrării subcutanate pot apărea tumefieri care dispar de la sine peste 2-3 ore.

4.7 Utilizarea în perioada de gestație și alăptare

Fără restricții.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Compatibil.

4.9 Doza și calea de administrare

4.9.1 Doze (ml per animal):

- Cabaline - 300 - 2500;
- Bovine - 500 - 3000;
- Ovine, caprine – 100 - 500;
- Porcine - 10 - 150;
- Câini - 20 - 100.

4.9.2 Mod de administrare:

Clorură de sodiu 0,9% soluție perfuzabilă se administrează i/venos, i/muscular sau subcutanat.

4.10 Supradozare

Nu sunt cazuri înregistrate.

4.11 Perioada de așteptare:

0 zile.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: soluție perfuzabilă

Codul ATC QB05-Soluții perfuzabile și substituenți ai sîngelui. – QB05XA03.

5.1.2 Mecanism de acțiune

Mecanismul de acțiune a preparatului Clorură de sodiu 0,9% soluție perfuzabilă se datorează prezenței ionilor de sodiu și de clor. Ionii de sodiu penetrează membrana celulară prin intermediu diferitor mecanisme de transportare, printre care o mare importanță are pompa de sodium-potasiu (Na-K-ATFaza). Sodiu joacă un rol important în transmiterea semnalului în neuroni, procesele electrofiziologice a inimii, în procesele metabolice renale.

5.1.3 Efecte farmacodinamice

Soluția dată, ia parte activă în echilibrul hidroelectrolitic, menține și reglează presiunea osmotica, posedă acțiune de rehidratare și detoxifiere, acoperă necesarul de sodiu în diferite patologii și temporar mărește volumul lichidului din circuitul sangvin.



5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică:

Se recomandă respectarea dozelor recomandate pentru a nu diminua eficiența terapeutică.

5.2 Proprietăți farmacocinetice:

Se elimină preponderent pe cale renală (cu urina), astfel având loc reabsorbția sodiului (reabsorbția renală). O cantitate mică de sodiu este eliminat din organism cu masele fecale și prin transpirație.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Apă pentru injecții.

6.2 Incompatibilități:

Nu sunt.

6.3 Perioada de valabilitate:

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicată pe ambalaj.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra la loc întunecos, la $T^{\circ}\text{C} +2^{\circ}\text{C} - +25^{\circ}\text{C}$.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacon din sticlă a câte 8; 16; 50; 100; 200 și 400 ml, flacon din polietilenă a câte 100 ml.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Medicamentul nefolosit se utilizează conform reglementării locale, ambalajele se utilizează cu deșeurile menajere.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

OOO "Brovafarma", Ucraina, or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

210054

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

11.06.2021

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

06/2021

