

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

PIGULIN®

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
 - Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
 - Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 - Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
 - Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră.
- Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Mosagroen SA, Rusia

г. Москва, проезд Дорожный 1-й, дом 1, строение 1.

Telefon +7(495)744-0645; fax+7(495)744-0645

E-mail: mag@mosagroen.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Pigulin®

1 doză conține:

Substanța activă:

Gonadotropina serică ecvină (PMSG) - 400 UI

Gonadotropină corionică umană (hCG) - 200 UI

Excipient:

Glicină, fosfat de monopotasiu, fosfat disodic

Liofilizat pentru prepararea soluției injectabile.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Pigulin® este utilizat pentru a spori funcția de reproducere și pentru a crește fertilitatea scroafelor și a scrofițelor.



4. CONTRAINDICAȚII

Este interzisă administrarea medicamentului la scrofițelor cu chisturi foliculare și luteale, animale slăbite, care nu au ajuns la pubertate, precum și în ferme favorabile bolilor infecțioase. Nu se va administra la femelele gestante.

5. REACȚII ADVERSE

Când utilizați Pigulin® în conformitate cu acest prospect, efectele secundare și complicațiile nu sunt de obicei observate.

În caz de reacții alergice, utilizarea medicamentului este oprită și animalele sunt prescrise antihistaminice și medicamente simptomatice.

6. SPECII ȚINTĂ

Porcine (scroafe și scrofițe).

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Prepararea soluției pentru administrare:

Înainte de administrare, conținutul flaconului, indiferent de doză, este dizolvat în 5 ml de soluție fiziologică sterilă sau apă pentru injecții. Medicamentul dizolvat trebuie păstrat la frigider și utilizat în decurs de 12 ore.

Medicamentul este injectat intramuscular în gât sau în regiunea parotidă.

Scroafelor, pentru a stimula căldurile și creșterii fertilității, se administrează o doză imediat după înțarcarea purceilor sau pe parcursul următoarelor 48 de ore.

La anestrul, se administrează o doză aproximativ peste 10 zile după înțarcarea purceilor.

La anestrul, scrofițelor pentru reproducere li se administrează 1 doză la vârsta de 5,5-6,5 luni și la atingerea greutateii corporale de 85-100 kg.

Scrofițele pentru reproducere, care sunt pregătite pentru prima însemințare, pot fi înseminate în primul estru după tratament. Dacă însemințarea este transferată la un al doilea estru, după tratament, este posibilă fătarea unui număr mai mare de purceluși.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra medicamentul în ambalaj original, închis, într-un loc protejat de lumina directă a soarelui, separat de alimente și furaje, la o temperatură cuprinsă între 2 °C și 10 °C.

Medicamentul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.



10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul neutilizat se elimină în conformitate cu cerințele locale legale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Medicamentul este utilizat, de regulă, o singură dată.

Particularitățile acțiunii medicamentului la prima utilizare și la retragerea lui nu au fost stabilite.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu sunt.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul manipulării medicamentului, să recomandă respectarea regulilor generale de igienă personală și a măsurilor de siguranță, prevăzute în timpul lucrului cu medicamente.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Pigulin®.

Nu mâncați, nu consumați băuturi și nu fumați în timp ce manipulați medicamentul.

La finisarea lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

Flacoanele goale a medicamentului sunt interzise pentru utilizare în scopuri casnice, ele trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere.

În caz de contact accidental al medicamentului cu pielea sau membranele mucoase ale ochilor, acestea trebuie clătite cu multă apă.

În caz de reacții alergice sau ingestie accidentală a medicamentului în organismul uman, trebuie să contactați imediat o instituție medicală (ar trebui să aveți prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Este interzisă utilizarea Pigulin® pentru animalele gestante.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

Supradozare

Nu se cunosc.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului așa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.

Perioada de valabilitate după reconstituire conform instrucțiunilor: 12 ore.

Nu utilizați medicamentul după data de expirare indicat pe ambalaj.





13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pigulin® este ambalat a câte 1 doză în flacoane de sticlă cu capacitatea de 10 ml, sigilate cu dopuri de cauciuc, acoperite cu capace din aluminiu.

Flacoanele sunt ambalate în cutii de carton a câte 20. Fiecare cutie este furnizat cu prospect de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

07/2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

