

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

RolfClub 3D picături pentru câini se administrează câinilor și cățelelor de vârstă mai mare de 12 săptămâni în caz de entomoze (purici, păduchi hematofagi din subordinea de insecte aptere, păduchi din subordinea Ischnocera), otodectoză, râie sarcoptică, infestare cu căpușe Ixodida, pentru a proteja animalele de atacul insectelor diptere.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

Nu se utilizează animalelor bolnave de maladii infecțioase și convalescente, la căței cu vârstă mai mică de 12 săptămâni, altor specii de animale.

Nu este permisă utilizarea auriculară a medicamentului (forma auriculară a scabiei), în caz de perforarea membranei timpanice.

5. REACȚII ADVERSE

Efectele secundare și complicațiile la utilizarea RolfClub 3D picături pentru câini în conformitate cu prospectul de utilizare, de regulă, nu sunt observate.

În caz de sensibilitate individuală crescută a animalului la componentele medicamentului, pot apărea reacții individuale (hipersalivație, lacrimare, semne de iritare a pielii). În acest caz animalul bine se spală cu șampon și la necesitate se indică terapia de desensibilizare.


6. SPECII ȚINTĂ

Câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Picăturile RolfClub 3D pentru câini se administrează extern o dată prin aplicare pe piele spot-on. Se scoate tubul-pipeta din ambalaj, vârful pipetei se taie cu foarfece. Se desface blana animalului astfel încât pielea să fie vizibilă și se aplică medicamentul pe pielea uscată și nedeteriorată, în regiunea gâtului la baza craniului sau între omoplați (în locuri inaccesibile animalelor pentru lins), în doze indicate în tabel:

Greutatea animalului, kg	Doza de medicament, ml
< 4	0,5
> 4 – 10	1,0
> 10 – 20	1,5
> 20 – 40	2,5
> 40 – 60	4,0



Pentru tratarea câinilor cu o greutate corporală mai mare de 60 kg, pentru fiecare 5 kg greutate ulterioare se va aplica a câte 0,5 ml de soluție, se va utiliza o combinație de pipete cu volume diferite. Tratamentele repetate se efectuează conform indicațiilor, dar nu mai mult decât o dată pe lună.

Pentru nimicirea căpușelor Ixodida pe corpul animalului, soluția se aplică pe căpușă și locul de fixare a căpușei pe piele, în cantitate de 1 picătură. În caz dacă căpușa nu cade peste 20 de minute, atunci se îndepărtează atent cu o pensetă și se nimicește.

În caz de otodectoză (râie auriculară) canalul urechii externe se curăță de cruste, apoi se picură în fiecare ureche a câte 1-3 picături de soluție (în raport cu mărimea animalului). Ușor se masează pavilionul urechii la bază. Tratamentul se repetă de 2-3 ori cu interval de 5-7 zile. Este necesar ca soluția să fie aplicată în ambele urechi, chiar și în cazurile când este afectată de otodectoză o singură ureche.

În cazul unui curs sever al bolii se recomandă ca tratamentul animalului să fie efectuat în complex cu utilizarea de medicamente patogenetice și simptomatice.

În caz de sarcoptoză soluția se aplică într-un strat subțire pe suprafețele afectate, se distribuie cu vârful degetelor în mânășă de la periferie în centru cu captarea pielii sănătoase de până la 1 cm, conform dozelor indicate în tabel.

Tratamentul se efectuează de 2 - 4 ori, cu interval de 7 - 10 zile, până la însănătoșirea animalului, ce se adeverește cu două rezultate negative a examenului acarologic de laborator.

Animalele cu suprafețe mari afectate se prelucreză în două etape cu interval de 1 zi, aplicând soluția mai întâi pe o parte a corpului, apoi pe cealaltă parte afectată a corpului.

Pentru a se evita ca animalul să se lingă, se fixează pe gât un guler de protecție, botniță sau maxilarii se închid cu panglică într-o buclă, care se scot peste 20-30 minute după aplicare.

Nu se recomandă spălatul și scăldatul animalelor, nu se permite ca animalele să între în rezervoarele naturale timp de 48 ore după prelucrare.

Moartea insectelor, detașarea și moartea căpușelor Ixodida au loc în 1-2 ore de la tratamentul animalului. Durata efectului protector după o singură aplicare a soluției pe animal: contra căpușelor Ixodida până la 30 de zile, contra puricilor, păduchilor până la 60 de zile, contra insectelor diptere până la 7 zile.


8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original închis, la loc uscat, protejat de acțiunea directă a razelor solare, separat de alimente și furaje, la temperaturi de la 2°C până la 25°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.



10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul neutilizat este eliminat în conformitate cu cerințele legislației locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu este destinat utilizării la animale productive.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite. Trebuie de evitat încălcările regimului utilizării a picăturilor, deoarece aceasta poate duce la o scădere a eficienței.

În caz dacă prelucrarea animalului planificată a fost omisă, aceasta trebuie efectuată cât mai curând posibil în aceeași doză.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul manipulării RolfClub 3D picături pentru câini, trebuie să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță, prevăzute în timpul lucrului cu medicamente.

Nu fumați și consumați alimente sau băuturi în timpul aplicării.

La finisarea lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

Animalele tratate nu trebuie scăldate, manipulate și nu trebuie să fie permis contactul cu copii timp de 48 ore după prelucrare.

În caz de contact accidental cu pielea sau ochii clătiți imediat cu apă în abundență.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Rolf Club 3D picături pentru câini.

În caz de reacție alergică sau în caz de ingestie accidentală, trebuie imediat de contactat o instituție medicală (să prezentați prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Cățelele gestante sau aflate în lactație nu se supun tratamentului cu picături.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiuni:

RolfClub 3D picături pentru câini nu trebuie utilizat simultan cu alte insectoacaricide.

Supradozare

În caz de supradozare la câini pot fi observate salivare abundentă, lacrimare, semne de iritare a pielii.

În acest caz animalul bine se spală cu șampon și la necesitate se indică terapia simptomatică.

