



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Cistotel zooșampon

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SA Firma științifico-productivă "Ecoprom", Rusia 140070

regiunea Moscova, Lyubertsy, R. P. Tomilino, str. Garshina nr. 11/23, sediu 263

Telefon: +79031045975

E-mail: litvinenko@ekoprom.org

www.ekoprom.org

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Cistotel zooșampon

Substanța activă:

Permetrin-4,2 mg/ml (0,4%)

Excipienți:

Laurilsulfat de sodiu etoxilat, acid citric, ulei de ricin hidrogenat, sare de masă, dietanolamidă a uleiului de nucă de cocos, alcool benzilic semiformal, parfum pe bază de plante, colorant "Sanset" și apă potabilă.

Soluție pentru uz extern.

Soluție transparentă de culoare galbenă.



3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Cistotel zooșampon este utilizat pentru a distruge agenții patogeni ai entomozelor (purici, păduchi hematofagi din subordinea de insecte aptere, păduchi din subordinea Ischnocera) care parazitează pe câini și pisici.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

Nu se utilizează animalelor slăbite/cașectice, bolnave de maladii infecțioase și convalescente.

5. REACȚII ADVERSE

Efectele secundare și complicațiile la utilizarea Cistotel zooșampon, în conformitate cu prospectul de utilizare, de regulă, nu sunt observate.

În caz de sensibilitate individuală crescută a animalului la permetrină, pot apărea reacții individuale (hipersalivație, lacrimare, semne de iritare a pielii). În acest caz animalul bine se spală cu apă și la necesitate se indică terapia antihistaminică și simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Pisici și câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Animalul înainte se spală cu apă caldă din abundență, pentru a uda blana. Apoi se aplică șamponul, în raport de 0,5-1,0 ml la 1 kg de greutate corporală, se freacă ușor până se formează spumă, evitând contactul cu ochii și împiedicând animalul să lingă insecticidul. Se va lăsa spuma să acționeze timp de 5-7 minute, apoi se clătește cu apă caldă, se pieptănă și se usucă blana.

Tratamentele repetate se efectuează conform indicațiilor, dar nu mai mult decât o dată în 15 zile.

În scopul de a preveni re-infestarea cu purici, se înlocuiesc așternuturile animalelor sau se prelucrează cu șampon în diluție 1:2, în raport 10 ml/m² a suprafeței prelucrate. Timp de 3 zile nu se permite contactarea animalului cu așternutul, iar pentru următoare utilizare se spală bine cu detergent.


8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Depozitați Cistotel zooșampon în ambalajul închis al producătorului, într-un loc protejat de lumina directă a soarelui, separat de alimente și furaje, la o temperatură cuprinsă între 0°C și 30°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.



10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul neutilizat este eliminat în conformitate cu cerințele legislației locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu este destinat utilizării la animale productive.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul manipulării Cistotel zooșampon, trebuie să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță, prevăzute în timpul lucrului cu medicamente.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Cistotel zooșampon.

Nu fumați și consumați alimente sau băuturi în timpul aplicării.

La finisarea lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

Stăpânul animalului în timpul utilizării Cistotel zooșampon, trebuie să folosească mănuși din cauciuc.

În caz de contact accidental cu pielea sau ochii, clătiți imediat cu apă în abundență.

În caz de reacție alergică sau în caz de ingestie accidentală, trebuie imediat de contactat o instituție medicală (să prezentați prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Femelele gestante sau aflate în lactație nu se spală cu Cistotel zooșampon.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu utilizați alte medicamente insectoacaricide în același timp.

Supradozare

Simptome de supradozare nu au fost observate.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de 3 ani de la data producerii.

Este interzisă utilizarea șamponului după data de expirare.



13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din polimeri a câte 180 ml, acoperite cu capace din plastic.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

08/2021



NUMAI PENTRU UZ VETERINAR