

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Cistotel zooșampon

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Substanța activă:

Permetrin-4,2 mg/ml (0,4%)

Excipienți:

Laurilsulfat de sodiu etoxilat, acid citric, ulei de ricin hidrogenat, sare de masă, dietanolamidă a uleiului de nucă de cocos, alcool benzilic semiformal, parfum pe bază de plante, colorant "Sanset" și apă potabilă.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție pentru uz extern.

Soluție transparentă de culoare galbenă.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Pisici și câini.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă:

Cistotel zooșampon este utilizat pentru a distruge agenții patogeni ai entomozelor (purici, păduchi hematofagi din subordinea de insecte aptere, păduchi din subordinea Ischnocera) care parazitează pe câini și pisici.

4.3 Contraindicații:

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

Nu se utilizează animalelor slăbite/cașectice, bolnave de maladii infecțioase și convalescente.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu este destinat utilizării la animale productive.


4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul manipulării Cistotel zooșampon, trebuie să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță, prevăzute în timpul lucrului cu medicamente.



Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Cistotel zooșampon.

Nu fumați și consumați alimente sau băuturi în timpul aplicării.

La finisarea lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

Stăpânul animalului în timpul utilizării Cistotel zooșampon, trebuie să folosească mănuși din cauciuc.

În caz de contact accidental cu pielea sau ochii, clătiți imediat cu apă în abundență.

În caz de reacție alergică sau în caz de ingestie accidentală, trebuie imediat de contactat o instituție medicală (să prezentați prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):

Efectele secundare și complicațiile la utilizarea Cistotel zooșampon, în conformitate cu prospectul de utilizare, de regulă, nu sunt observate.

În caz de sensibilitate individuală crescută a animalului la permetrină, pot apărea reacții individuale (hipersalivație, lacrimare, semne de iritare a pielii). În acest caz animalul bine se spală cu apă și la necesitate se indică terapia antihistaminică și simptomatică.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Femelele gestante sau aflate în lactație nu se spală cu Cistotel zooșampon.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu utilizați alte medicamente insectoacaricide în același timp.

4.9 Doză și calea de administrare

4.9.1 Doze:

0,5-1,0 ml la 1 kg de greutate animală

4.9.2 Mod de administrare:

Animalul înainte se spală cu apă caldă din abundență, pentru a uda blana. Apoi se aplică șamponul, în raport de 0,5-1,0 ml la 1 kg de greutate corporală, se freacă ușor până se formează spumă, evitând contactul cu ochii și împiedicând animalul să lingă insecticidul. Se va lăsa spuma să acționeze timp de 5-7 minute, apoi se clătește cu apă caldă, se pieptănă și se usucă blana. Tratamentele repetate se efectuează conform indicațiilor, dar nu mai mult decât o dată în 15 zile.

În scopul de a preveni re-infestarea cu purici, se înlocuiesc așternuturile animalelor sau se prelucreează cu șampon în diluție 1:2, în raport 10 ml/m² a suprafeței prelucrate.


Timp de 3 zile nu se permite contactarea animalului cu așternutul, iar pentru următoare utilizare se spală bine cu detergent.

4.10 Supradozare

Simptome de supradozare nu au fost observate.

4.11 Perioada de așteptare:

Nu este cazul.



5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: piretroide sintetice.

codul ATC: QP53AC04

5.1.2 Mecanism de acțiune:

Mecanismul de acțiune constă în blocarea transmiterii impulsurilor nervoase prin perturbarea funcționării canalelor de sodiu în membranele celulelor nervoase, care provoacă tulburări de coordonare a mișcărilor, paralizie și moartea de ectoparaziților.

5.1.3 Efecte farmacodinamice:

Permetrin (3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimetil-cic-lopropanecarboxylate), asigură o acțiune insecticidă contra puricilor, păduchilor hematofagi din subordinea de insecte aptere, păduchilor din subordinea Ischnocera, care parazitează pe câini și pisici.

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică:

Cistotel zooșampon în funcție de gradul de impact asupra organismului, aparține grupului de substanțe cu pericol scăzut (clasa de pericol 4 conform GOST 12.1.007-76), în dozele recomandate nu posedă efect iritant local și sensibilizant, în cazul unui contact cu ochi provoacă o iritare ușoară. Este toxic pentru albiși, pești și alte hidrobiote.

5.2 Proprietăți farmacocinetice:

Nu au fost evidențiate semne caracteristice în urma administrării sistemice a substanței active.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Laurilsulfat de sodiu etoxilat, acid citric, ulei de ricin hidrogenat, sare de masă, dietanolamidă a uleiului de nucă de cocos, alcool benzilic semiformal, parfum pe bază de plante, colorant "Sanset" și apă potabilă.

6.2 Incompatibilități:

Nu utilizați alte medicamente insectoacaricide în același timp.

6.3 Perioada de valabilitate:

Termenul de valabilitate este de 3 ani de la data producerii.


Este interzisă utilizarea șamponului după data de expirare.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

Depozitați Cistotel zooșampon în ambalajul închis al producătorului, într-un loc protejat de lumina directă a soarelui, separat de alimente și furaje, la o temperatură cuprinsă între 0°C și 30°C. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Flacon din polimeri a câte 180 ml, acoperite cu capace din plastic.



6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Medicamentul neutilizat este eliminat în conformitate cu cerințele legislației locale.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SA Firma științifico-productivă "Ecoprom", Rusia

www.ekoprom.org

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

210078

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

26.08.2021

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

08/2021

