

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Insectal picături

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SA Firma științifico-productivă "Ecoprom", Rusia 140070

regiunea Moscova, Lyubertsy, R. P. Tomilino, str. Garshina nr. 11/23, sediu 263

Telefon: +79031045975

E-mail: litvinenko@ekoprom.org

www.ekoprom.org

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Insectal picături

Substanța activă:

Fipronil – 99 mg (10%);

Piriproxifen – 19,8 mg (2%)

Excipienți:

Dimetilsulfoxid, alcool izopropilic și polietilenglicol-400.

Soluție pentru uz extern.

Soluție transparentă de culoare galbenă.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Insectal picături se administrează câinilor și pisicilor pentru tratamentul și profilaxia entomozelor, otodectozelor, sarcoptozelor, notoedrozelor și acarozelor cauzate de căpușe Ixodida.



4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

Nu se recomandă să fie utilizat iepurilor, animalelor bolnave de maladii infecțioase și convalescente, animalelor cu greutatea corporală mai mică de 2 kg.

Nu este permisă utilizarea auriculară a medicamentului (forma auriculară a scabiei), în caz de perforarea membranei timpanice.

Nu se utilizează animalelor cu vârsta mai mici de 3 luni.

5. REACȚII ADVERSE

Efectele secundare și complicațiile la utilizarea Insectal picături în conformitate cu prospectul de utilizare, de regulă, nu sunt observate.

În caz de sensibilitate individuală crescută a animalului la componentele medicamentului, pot apărea reacții individuale (hipersalivație, lacrimare, semne de iritare a pielii). În acest caz tratamentul este oprit, animalul bine se spală cu apă și șampon.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini și pisici.


7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Insectal picături se administrează pe piele uscată și nedeteriorată, prin aplicare spot-on. Vârful pipetei se rupe sau se taie cu foarfece. Se desface blana animalului astfel încât pielea să fie vizibilă și se aplică medicamentul în regiunea gâtului la baza craniului sau între omoplați (în locuri inaccesibile animalelor pentru lins), în doze indicate în tabel:

Greutatea animalelor	Doza de medicament (volumul nominal al pipetei), ml
De la 2 pînă la 4 kg	0,5
De la 4 pînă la 10 kg	0,8
De la 10 pînă la 20 kg	1,5
De la 20 pînă la 40 kg	2,9
De la 40 pînă la 60 kg	4,3

Pentru tratarea câinilor cu o greutate corporală mai mare de 60 kg, folosind o combinație de pipete cu volume diferite. Se aplică pe piele în 3-4 locuri.

Tratamentele repetate se efectuează conform indicațiilor, dar nu mai des decât o dată pe lună.





În scopul de a preveni re-infestarea cu purici, se înlocuiesc așternuturile animalelor sau se prelucrează cu un insecticid în conformitate cu prospectul de utilizare.

Efectul acaricid al medicamentului se manifestă după 12-24 de ore, ținând seama de acest lucru, tratamentele trebuie efectuate nu mai târziu de 24 de ore înainte de plimbare presupusă al animalului în zonele de posibilă locuire a căpușelor (parcuri, păduri).

Pentru nimicirea căpușelor Ixodida pe corpul animalului, soluția se aplică pe căpușă și locul de fixare a căpușei pe piele, în cantitate de 1 picătură. În caz dacă căpușa nu cade peste 20 de minute, atunci se îndepărtează atent cu o pensetă și se nimicește.

În caz de otodectoză canalul urechii externe se curăță de cruste, apoi se picură în fiecare ureche a câte 3-5 picături de soluție. Ușor se masează pavilionul urechii la bază. Restul medicamentului din pipetă se aplică între omoplați (în raport cu greutatea corporală a animalului). Tratamentul se repetă de 2-3 ori cu interval de 5-7 zile.

În cazul complicațiilor de otită se prescriu antimicrobiene și antiinflamatoare.

La necesitate cursul de tratament se repetă peste 1 lună, efectuând examenul microscopic al raclajului pielii.

În caz de perforarea membranei timpanice medicamentul se aplică pe piele prin picurare între omoplați la baza gâtului, în doze indicate în tabel.

În caz de sarcoptoză și notoedroză soluția se aplică într-un strat subțire pe suprafețele afectate, preventiv curățate de cruste, uniform pe toată suprafața afectată și 1 cm de țesut limitrof (de la periferii spre centru), în raport 0,8 ml/10 kg greutate corporală a animalului.

Tratamentul se efectuează de 2 - 4 ori, cu interval de 7 - 10 zile.

Animalele cu suprafețe mari afectate se prelucrează în două etape cu interval de 1 zi, aplicând soluția mai întâi pe o parte a corpului, apoi pe cealaltă parte afectată a corpului.

Pentru a se evita ca animalul să se lingă, se fixează pe gât un guler de protecție, botniță sau maxilarii se închid cu panglică într-o buclă, care se scot peste 20 minute după aplicare.

Se recomandă ca tratamentul să se efectueze în complex cu medicamente patogenetice și simptomatice, pînă la însănătoșirea animalului, ce se adeverește cu două rezultate negative a examenului microscopic al raclajului pielii.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original închis, la loc uscat, protejat de acțiunea directă a razelor solare, separat de alimente și furaje, la temperaturi de la 2°C pînă la 25°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.



10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul neutilizat este eliminat în conformitate cu cerințele legislației locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu este destinat utilizării la animale productive.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.

Trebuie de evitat încălcările regimului utilizării a picăturilor, deoarece aceasta poate duce la o scădere a eficienței. În caz dacă prelucrarea animalului planificată a fost omisă, aceasta trebuie efectuată cât mai curând posibil în aceeași doză.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul manipulării Insectal picături, trebuie să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță, prevăzute în timpul lucrului cu medicamente.

Nu fumați și consumați alimente sau băuturi în timpul aplicării.

La finisarea lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental cu pielea sau ochii clătiți imediat cu apă în abundență.

Animalele tratate nu trebuie scăldate, manipulate și nu trebuie să fie permis contactul cu copii timp de 48 ore după prelucrare.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Insectal picături.

În caz de reacție alergică sau în caz de ingestie accidentală, trebuie imediat de contactat o instituție medicală (să prezentați prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se supun tratamentului femelele gestante sau aflate în lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Insectal picături nu trebuie utilizat simultan cu alte insectoacaricide.

Supradozare

Simptome de supradozare nu au fost observate.



Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
INREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de 3 ani de la data producerii.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Tuburi-pipete polimerice x 0,5; 0,8; 1,5; 2,9; 4,3 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

08/2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

