

**PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

**ALBEN<sup>R</sup>**  
granulat

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

OOO "NVȚ Agrovetzașcita",  
141300, Rusia, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Țentralinaia 1

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Alben<sup>R</sup> granulat.  
Pulbere granulată pentru uz intern, de culoare gri.

1 g de medicament conține:

**Substanța activă:**

Albendazol - 200 mg

**Excipienți:**

Polivinilpirolidon, stearat de calciu, amidon din cartof și lactoză.

**3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Alben<sup>R</sup> granulat se indică în dehelmintizarea bovinelor, ovinelor, caprinelor, în cazul nematodozelor, cestodozelor, trematodozelor inclusiv:

- nematodoze gastrointestinale (*Haemonchus sp*, *Bunostomum sp*, *Oesophagostomum sp*, *Chabertia ovina*, *Strongyloides spp*, *Triichocephalus spp*, *Nematodirus sp*, *Ostertagia spp*, *Cooperia sp*).
- nematodoze pulmonare (*Dictyocaulus spp*, *Protostrongylus spp*, *Metastrongylus spp*).
- cestodoze (*Moniezia expanza et benedeni*, *Avitellina sp*, *Diphyllobotrium latum*)
- trematodoze (*Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*, *Paramphistomum spp*).



#### 4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită la albendazol. A nu se administra în cazul fasciolozei acute, animalelor istovite și bolnave de boli infecțioase.

Se interzice administrarea Alben<sup>R</sup> granulat în timpul monei.

#### 5. REACȚII ADVERSE

În doze terapeutice (conform instrucțiunii date) nu provoacă reacții adverse. În caz de sensibilitate individuală sporită și apariția reacției alergice, administrarea se stopează și se indică terapie simptomatică.

#### 6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, caprine, ovine.

#### 7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Dehelmintizarea animalelor cu scop curativ se efectuează la indicația medicului veterinar, preventiv-primăvara înainte de pășunat și toamna înainte de stabulație.

Dietă specială sau administrarea laxativelor în prealabil nu necesită.

Alben<sup>R</sup> granulat se administrează per oral, individual sau în grup, în amestec cu hrană - bovinelor, ovinelor, caprinelor - 1 dată, în doze (în raport cu greutate corporală) indicate în tabel:

Specia animalului	Doza Alben <sup>R</sup> granulat, g/kg greutate corp.
BOVINE	3,75g/100 kg
În fascioloză, paramfistomidoză, ostertagioză	5,0g/100 kg
OVINE, CAPRINE	2,5 g/100 kg
În fascioloză, protostrongilidoză	3,75 g/100 kg

Administrarea în grup presupune: doza calculată de Alben<sup>R</sup> granulat se omogenizează cu combifurajul (cantitatea raportată per animal):

- bovine – 0,5-1,0 kg;
- ovine, caprine -150-200 g;

Amestecul medicamentat primit se plasează în iesle pentru un grup de 10-100 animale, oferindu-le acces liber la iesle.

Lingura dozatoare este în pachet și cuprinde (fără vîrf) 5,0 g de medicament, prima măsură de jos corespunde cu 2,5 g, a doua cu 3,75 g.

În prealabil dehelmintizării în masă, fiecare serie de medicament se testează pe un grup nu prea mare (5-10 animale de fermă). În lipsa complicațiilor timp de 3 zile, se recurge la dehelmintizare a întregului șeptel.

#### 8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Sacrificarea animalelor - 20 zile. Lapte -4 zile.

Carcasele, lapte obținute înainte de expirarea termenului limită-se dă în hrana animalelor carnivore.



### **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra în ambalaj original închis, la loc întunecos, uscat, separat de produse alimentare și furaje, la temperatură de la 2°C până la 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

### **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Medicamentul nefolosit se utilizează conform reglementării locale, ambalajele se utilizează cu deșeurile menajere.

### **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

#### **Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:**

Nu sunt.

#### **Precauții speciale pentru utilizare la animale:**

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.

Trebuie de evitat încălcările regimului utilizării a medicamentului, deoarece aceasta poate duce la o scădere a eficienței terapeutice. În caz dacă dehelmintizarea animalului planificată a fost omisă, aceasta trebuie efectuată cât mai curând posibil în aceeași doză.

#### **Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:**

În timpul lucrului cu Alben<sup>R</sup> granulat e necesar de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar. Persoanelor hipersensibile la componentele medicamentului li se recomandă evitarea contactului direct cu Alben<sup>R</sup> granulat. În caz de contact accidental a medicamentului cu pielea sau tunicile mucoase oftalmice, ele se spală din abundență cu apă. În caz de apariție a reacției alergice sau la îngerare, e important de adresat la o instituție medicală cât de repede posibil (cu sine de avut eticheta sau prospectul). În timpul lucrului se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi. La finisarea lucrului mâinile se spală cu apă și săpun.

#### **Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:**

Nu se administrează caprelor, oilor în prima jumătate a gestației, vacilor în primul trimestru a gestației.

Particularitățile acțiunii în caz de administrare în perioada de lactație nu s-au observat.

#### **Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:**

Administrarea concomitentă cu praziquantel, azinox și dexametazon duce la majorarea concentrației de albendazol în sînge.



Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63  
ÎNREGISTRAREA DE STAT  
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR  
**APROBAT**

### **Supradozare:**

În cazul supradozării la animal se poate manifesta anorexie, tulburări de motilitate intestinală, necoordonare motorie, letargie. În astfel de cazuri administrarea se stopează și se indică terapie simptomatică.

### **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

Termen de valabilitate este 3 ani din data producerii.

Termen de valabilitate după prima deschidere: 6 luni.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

### **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează cu prescripție veterinară.

### **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Pungi x 20g, 0,5kg, 1,0kg; căldări din polimer x 1kg, 10kg.

În fiecare ambalaj se conține prospectul de utilizare și o linguriță de măsurare.

### **15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI**

10/2021

### **16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, mun. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)

**NUMAI PENTRU UZ VETERINAR**

