

Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ProfiLine picături antiparazitare pentru câini

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SRL «NPP «SUZIRYA», str. Poltavskii șleah, 115, or. Harkov, 61093, Ucraina

SRL «NPP «SUZIRYA», str. Zernovaia, 4, or. Harkov, 61105, Ucraina

tel.: +38 (057) 766-36-36

office@priroda.ua

priroda.ua

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA.

ProfiLine picături antiparazitare pentru câini.

1 pipetă de conține :

Substanțe active:

Fipronil – 10 %;

S- metopren – 10 %.

Excipienți:

Polietilenglicol-400;

Alcool izopropilic;

N-metilpirolidonă.

Picături de uz extern.

Lichid transparent de culoare galben deschis cu un miros specific.



3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu ectoparaziți (purici (*Ctenocephalides* spp.), păduchi (*Linognathus* spp.), păduchi hematofagi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) și căpușe (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp., *Ixodes* spp.) la câini.

Prevenirea și tratamentul dermatitei alergice provocate de purici la câini.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra animalelor bolnave, epuizate și slăbite.

A nu se administra la animale cu vârsta sub 8 săptămâni.

A nu se administra la animale cu sensibilitate individuală crescută la componentele medicamentului.

5. REACȚII ADVERSE

În zona aplicării medicamentului pot apărea semne de păr gras, este posibilă o ușoară lipire a blănii, care dispar rapid; rar reacții ușoare la piele (mâncărime, căderea blănii, roșeață).

În caz dacă animalul linge zona de aplicare, poate să apară salivăție, vomă și semne de tulburări nervoase.

În cazul persistenței ulterioare a reacțiilor adverse, cereți ajutorul medicului veterinar.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZĂ PRESCRISĂ

Medicamentul este destinat administrării externe, se aplică direct pe piele într-un loc inaccesibil pentru lins (regiunea greabănului și de-a lungul coloanei vertebrale).

Medicamentul se aplică pe pielea uscată și intactă. Scoateți pipeta cu o singură doză, îndepărtați blana animalului și aplicați medicamentul direct pe piele între omoplați în zona cefei.

Medicamentul este utilizat în ambalaje diferite, respectiv, cu doza minimă recomandată, care depinde de greutatea corporală a animalului.

Câini, greutatea corporală, kg	Doza medicamentului, ml	Cantitatea pipetelor, buc.
sub 4 kg	0,5	1
4-10 kg	1,0	1
10-20 kg	2,0	1
20-40 kg	3,0	1
de peste 40 kg	Combinația de pipete corespunzătoare	

Tratarea animalelor se efectuează în perioada activității sezoniere a paraziților la necesitate, dar nu mai des decât o dată la 30 zile.



Pentru a preveni infestarea animalelor cu ectoparaziți, este necesară schimbarea și prelucrarea periodică a așternutului pentru animale cu remedii insecticide corespunzători, precum și prelucrarea regulată a locurilor în care se adăpostesc.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat și întunecat, separat de alimente și furaje, inaccesibil copiilor și animalelor, la o temperatură de la 0°C până la 30°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul neutilizat sau expirat este eliminat în conformitate cu legislația în vigoare.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (interdicții)

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

În timpul tratării a nu se permite contactul medicamentului cu ochii, membranele mucoase și cavitatea bucală ale animalelor.

A nu permite animalelor proaspăt tratate să intre în contact cu alte animale.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

După aplicarea medicamentului în decurs de 24 de ore, evitați contactul cu apă (ploaie, îmbăiere) a locului de aplicare.

Scăldatul frecvent a animalelor cu șampon după tratamentul animalelor reduce eficacitatea medicamentului.

Tratamentele repetate se efectuează nu mai devreme de 4 săptămâni.

După aplicarea medicamentului, în decurs de 24 de ore, nu permiteți copiilor să mângâie, să se joace sau să doarmă cu animalul tratat.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Respectați principalele reguli de igienă și măsurile de securitate când lucrați cu medicamente de uz veterinar. Folosiți mănuși de cauciuc în timpul tratamentului animalului. După ce ați manipulat medicamentul, spălați-vă bine pe mâini, după caz, spălați și mănușile cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental cu pielea, mucoasele sau ochii, clătiți cu apă din abundență.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Administrarea medicamentului animalelor gestante sau celor lactante trebuie să se bazeze pe o evaluare a riscului și a necesității tratamentului de către un medic veterinar.



