

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

FENPRAZ

comprimate

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

AO"Agrobioprom", 105064, Federația Rusă, or. Moscova, str. Kazakova 6/1

Producator:

AO"Agrobioprom", 143985, reg. Moscova, Balașiha, ș. Poltevscoe 4

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Denumirea comercială - Fenpraz comprimate (*Fenpraz tablets*).

Denumirea internațională nepatentată: fenbendazol, pirantel, praziquantel.

Medicamentul dat se produce în 4 doze diferite :

Pentru căței și câini de talie mică.

1 comprimat/5 kg greutate corp: conține în calitate de substanțe active:

Fenbendazol - 75 mg, pirantel pamoat - 70 mg, praziquantel - 25 mg.

Pentru căței și câini de talie medie.

1 comprimat/8 kg greutate corp: conține în calitate de substanțe active:

Fenbendazol - 120 mg, pirantel pamoat - 112 mg, praziquantel - 40 mg.

Pentru căței și câini de talie mare.

1 comprimate/15 kg greutate corp: conține în calitate de substanțe active:

Fenbendazol - 225 mg, pirantel pamoat - 210 mg, praziquantel - 75 mg.

Pentru pisoiași și pisici.

1 comprimat/4 kg greutate corp: conține în calitate de substanțe active:

Fenbendazol - 60 mg, pirantel pamoat - 56 mg, praziquantel - 20 mg.





Excipienți: Amidon de porumb, stearat de calciu, lactoză, celuloză microcristalină.

Comprimate pentru uz intern (perorale).

Comprimate rotunde, de culoare galben pal.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Fenpraz comprimate se indică câinilor și pisicilor de la vârsta de 3 săptămâni, în profilaxia și tratamentul nematodozelor (toxocaroză, toxoscaridoză, uncinarioză, anchilostomoză, trichocefaloză), cestodozelor tractului digestiv (teniidoze, dipilidioză, echinococoză, difilobotrioză, mesocestoidoză), în giardioză și în invazii mixte.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitatea individuală sporită la componentele medicamentului (inclusiv în anamneză).

A nu se administra animalelor slăbite, bolnave de boli infecțioase sau în perioada de convalescență.

Este contraindicată dehelmintizarea cățeilor și pisoiașilor cu vârsta sub 3 săptămâni.

5. REACȚII ADVERSE

Reacții adverse și complicații la administrarea conform prospectului de utilizare, nu apar. În caz de sensibilitate sporită se poate manifesta diaree, vomă sau hipersalivație. Simptomele date sunt de scurtă durată și dispate de la sine.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Fenpraz comprimate se administrează animalelor per oral, 1 dată, individual, în amestec cu puțină hrană sau forțat pe rădăcina limbii.

Dietă cu foamea sau administrarea laxativelor nu se necesită.

La dehelmintizarea animalelor se recomandă dezinfectarea și dezinvazia obiectelor cu care animalul intră în contact (cușca, pătuț, jucării) pentru prevenția reînfestărilor.

Cu scop curativ animalele se dehelmintizează la indicația medicului veterinar, preventiv - trimestrial cu 10-14 zile înainte de vaccinare și cu 10 zile înainte de data presupusă a fătării în doze indicate în tabel.



Specia animalului	Greutate corp	Doza
Pisoiași și pisici	<1 kg	¼ pastilă
	1-2 kg	½ pastilă
	2-3 kg	¾ pastilă
	3-4 kg	1 pastilă
	1 comprimat la fiecare 4 kg de greutate corporală	
Căței și câini de talie mică	2,5 kg	½ pastilă
	5 kg	1 pastilă
	10 kg	2 pastile
	1 comprimat la fiecare 5 kg de greutate corporală	
Căței și câini de talie medie	<2 kg	1/4 pastilă
	4 kg	1/2 pastilă
	8 kg	1 pastile
	16 kg	2 pastile
	1 comprimat la fiecare 8 kg de greutate corporală	
Căței și câini de talie mare	15 kg	1 pastilă
	30 kg	2 pastilă
	45 kg	3 pastile
	60 kg	4 pastile
	1 comprimat la fiecare 15 kg de greutate corporală	

În tratamentul giardiozei, Fenpraz comprimate se administrează 1 dată pe zi, timp de 3 zile consecutiv.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T°C de la 0°C până la +25°C, inaccesibil copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

A nu se folosi animalelor productive.





Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Se recomandă respectarea dozelor și termenilor recomandați a administrărilor pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei sau mai multor doze, administrarea se reia în aceeași doză conform aceeași scheme. Nu se folosește dozaj dublu în locul celui omis.

Particularitățile acțiunii la prima administrare a medicamentului sau în caz de anulare acestuia, nu sunt stabilite.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Se recomandă respectarea dozelor și termenilor recomandați a administrărilor pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei sau mai multor doze, administrarea se reia în aceeași doză conform aceeași scheme. Nu se folosește dozaj dublu în locul celui omis.

Particularitățile acțiunii la prima administrare a medicamentului sau în caz de anulare acestuia, nu sunt stabilite.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Posibilitatea dehelmintizării femelelor gestante și în lactație cu Fenpraz comprimate este determinată de medicul veterinar analizând raportul risc/beneficiu.

Este contraindicată dehelmintizarea în primul semestru a gestației și primele 2- 3 săptămâni după fătare.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se administra concomitent cu piperazina, levamisolul și medicamente inhibitoare de colinesterază deoarece se poate intensifica reciproc toxicitatea.

Supradozare

Supradozarea poate provoca reacții adverse (inapetență, hipersalivație, vomă, diaree), în astfel de cazuri se recurge la terapie simptomatică.

12. PERIODA DE VALABILITATE

În ambalajul producătorului - 3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Fenpraz comprimate se produce ambalat a câte 2, 6 sau 10 bucăți în blistere; a câte 6 sau 10 bucăți în flacoane din polimer cu capac filetat securizat.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2021



Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63

ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

APROBAT

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a

tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

