

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**Picături insectoacaricide PUFFI**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa: „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,
s. Merenii Noi

telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39

e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Picături insectoacaricide PUFFI

1ml Picături insectoacaricide PUFFI conține:

Substanța activă:

Permetrină – 1 mg

Fipronil – 5 mg

Excipienți:

PEG – 400 –100 mg

Polisorbat 80 – 10 mg

Alcool izopropilic până la –1 ml

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Medicamentul picături insectoacaricide PUFFI este indicat pentru combaterea păduchilor, puricilor, căpușelor și maladiilor produse de ectoparaziți la pisici.



4. CONTRAINDICAȚII

Contraindicat animalelor lactante, celor aflate în perioada de convalescență, cât și tineretului mai mic de 10 săptămâni. În caz de sensibilitate individuală (intoxicații), care este manifestată prin lacrimație, salivație abundentă, vomă și frisoane, animalul va fi spălat cu apă caldă și se vor administra preparate antihistaminice.

Nu este recomandat scăldatul animalului cu 3 zile până, și 3 zile după prelucrare.

Păstrați recipientele bine închise. A se evita contactul cu ochii. A se evita aruncarea în mediul înconjurător. În timpul manipulării medicamentului se interzice de a fuma, a bea apă, a mânca. După utilizarea medicamentului mâinile se spală cu apă caldă și săpun.

5. REACȚII ADVERSE

La locul de aplicare al medicamentului pot să apară, înroșire trecătoare sau iritații ale pielii. Toate simptomele dispar, de obicei, în termen de 24 ore.

Urmărind prospectul de utilizare a producătorului și avertismentele, se vor reduce la minim posibilitățile de apariție a reacțiilor adverse.

6. SPECII ȚINTĂ

-Pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Medicamentul se aplică extern.

Picături insectoacaricide PUFFI se aplică câteva picături pe spate între omoplați și în regiunea gâtului la baza capului (locuri inaccesibile pentru a fi linse de către animal).

Pisici:

până la 1 kg	10 picături;
2 – 3 kg	20 picături;
4 – 8 kg	1 ml.

Aplicarea repetată a medicamentului se efectuează, 1 dată în lună în caz de infestări cu păduchi și purici, și 1 dată în 2 săptămâni în caz de infestări cu căpușe. Pentru prevenirea reinfestărilor cu purici și păduchi este important să fie prelucrat și așternutul animalului, prin pulverizare cu medicament insectoacaricid.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra în loc uscat, la temperatura 15 - 25°C, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.



10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

După aplicare, se va evita contactul cu animalele pentru o perioadă de 12 – 14 ore; de asemenea expunerea lor direct la razele solare trebuie evitată.

Animalele nu vor fi spălate sau expuse la ploaie timp de 12 ore după tratament.

Precauții speciale pentru utilizare

-Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Medicamentul trebuie administrat numai pe suprafața pielii.

Este important să vă asigurați că medicamentul este aplicat într-o zonă în care animalul nu se poate linge.

Nu permiteți animalelor tratate recent să se lingă reciproc.

A se evita contactul cu ochii animalului, în caz accidental clătiți ochii cu apă din abundență.

A nu se aplica medicamentul pe răni sau leziuni ale pielii.

-Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Recomandări pentru persoana care administrează medicamentul la animale:

Medicamentul este dăunător dacă este înghițit sau inhalat.

A se evita ingerarea medicamentului și inhalarea vaporilor.

A se evita contactul medicamentului cu ochii și pielea.

A se spăla mâinile și orice alte părți ale corpului care au intrat în contact cu medicamentul.

La manipularea medicamentului de uz veterinar trebuie purtat echipament de protecție personal, constând din mănuși de protecție.

În timpul manipulării medicamentului este interzis fumatul, consumul de alimente sau de lichide.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat.

Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar.

Nu se va administra femelelor lactante.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu administrați acest medicament concomitent cu alte insecticide sau medicamente ectoparazitare.





12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate în ambalaj original – 24 luni.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon- picurător de plastic cu volumul de 5 ml, ambalate în cutie de carton, însoțite de prospectul de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

