



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Gelmintal C

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa: SA Firma științifico-productivă "Ecoprom", Federația Rusă regiunea Moscova, Lyubertsy, R. P. Tomilino, Garshina str., 11/23, sediu 263
Telefon: +7 903 104 59 75; e-mail: litvinenko@ekoprom.org
www.ekoprom.org

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Gelmintal C

Într-un ml soluție se conține:

Substanța activă:

Moxidectină - 2,5%

Praziquantel - 4,0%

Excipienți:

Alcool izopropilic, polietilenglicol și dimetilsulfoxid.

Soluție pentru uz extern.

Soluție uleioasă, transparentă, incoloră sau de culoare galben deschisă.



3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Gelmintal C este prescris pentru câini în scopuri terapeutice și profilactice în caz de nematodoze intestinale (toxocaroză, toxascaridoză, uncinarioză, anchilostomoză), cestodoze (teniidoză, dipilidioză, echinococoză), entomoze cauzate de purici și păduchi, demodecoze, otodectoze și sarcoptoze, precum și pentru prevenirea dirofilariozei.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți, inclusiv în anamneză, dereglări evidențiate a funcțiilor renichilor și ficatului.

Nu se utilizează animalelor bolnave de maladii infecțioase și convalescente, și câini cu greutatea corporală sub 1 kg.

Nu se utilizează animalelor cu vârstă mai mici de 7 săptămîni. În caz necesar, tratamentul cățelușilor de rasă Collie, Bobtail și Sheltie se va efectua după o consultație cu medic veterinar.

5. REACȚII ADVERSE

Efecte secundare și complicații, atunci când se utilizează Gelmintal C în conformitate cu prospectul de utilizare, de regulă, nu sunt observate.

În cazuri rare, sunt posibile reacții cutanate individuale (roșeață, mâncărime), care trec spontan și nu necesită utilizarea medicamentelor. În cazul reacțiilor alergice la un animal sensibil la componentele medicamentului, trebuie animalul bine spălat cu apă și detergent și blana clătită cu o cantitate mare de apă curgătoare, iar dacă este necesar, de prescris medicamente antihistaminice și simptomatice.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Gelmintal C se administrează extern prin picurare (spot-on) pe piele uscată și nedeteriorată.

Înainte de utilizare vârful pipetei se taie cu foarfece. Se desface blana animalului astfel încât pielea să fie vizibilă, soluția se administrează în locuri inaccesibile animalelor pentru lins în regiunea gâtului la baza craniului sau între omoplați. Pentru tratarea câinilor mari conținutul pipetei se administrează pe piele în 3-4 locuri.

Doza terapeutică minimală a Gelmintal C constituie 0,1 ml/kg de greutatea corporală (respectiv 4 mg/kg de praziquantel și 2,5 mg/kg moxidectină).

În funcție de greutatea animalului, sunt utilizate diferite ambalaje de Gelmintal C în doze indicate din tabel:





Greutatea corporală a animalelor	Marcarea pe pipete	Doza de medicament, ml	Doza de substanțe active, mg per 1 kg de greutate corporală a animalului	
			praziquantel	moxidectină
De la 2 pin la 5 kg	Pentru câini cu o greutate de până la 10 kg	0,5 (1 pipetă cu 0,5 ml)	4 - 10	2,5 - 6,25
De la 5,1 pin la 10 kg	Pentru câini cu o greutate de până la 10 kg	1,0 (2 pipetă cu 0,5 ml)	4 - 8	2,5 - 5,0
De la 10,1 pin la 25 kg	Pentru câini cu o greutate mai mare de 10 kg	2,5 (1 pipetă cu 2,5 ml)	4 - 10	2,5 - 6,25
De la 25,1 pin la 50 kg	Pentru câini cu o greutate mai mare de 10 kg	5,0 (2 pipetă cu 2,5 ml)	4 - 8	2,5 - 5,0

Pentru tratarea câinilor cu o greutate corporală mai mare de 50 kg medicamentul se administrează în doză de 0,1 ml pentru fiecare kg de greutate corporală, utilizând o combinație de pipete cu volume diferite.

Pentru nimicirea puricilor și păduchilor tratamentul animalului se efectuează o singură dată, pentru prevenirea infestării repetate – o dată în 4-6 săptămâni, pe parcursul întregului sezon de activitate a paraziților.

În caz de otodectoză (râie auriculară) medicamentul se aplică pe piele. Se recomandă ca în procesul tratamentului canalul urechii externe să fie curățat de exsudat și de cruste, în cazul complicațiilor de otită se prescriu antimicrobiene și antiinflamatoare. La necesitate tratamentul se repetă peste 1 lună.

Cu scopul terapeutic în caz de sarcoptoză Gelmintal C se aplică de 2 ori, demodecoză – 2-4 ori cu interval de 28 zile; Cu scopul profilactic – o dată în lună.

Se recomandă ca tratamentul demodecozei să fie complex, folosind medicamente etiotope, patogenetice și simptomatice.

Pentru dehelmintizarea animalelor în caz de nematodoze și cestodoze intestinale medicamentul cu scopul terapeutic se administrează o singură dată, cu scopul profilactic – o dată în lună.

Cu scopul profilactic a dirofilariozei în regiunile nefavorabile la maladie Gelmintal C se utilizează în perioada primăvară-vară-toamnă: înainte de zborul a țânțarilor (purători de D.immitis) aplicînd o singură dată, apoi o dată în lună și ultima aplicare se efectuează nu mai devreme de 1 lună după finisarea zborului insectelor. Gelmintal C nimicește dirofilariile mature, dar micșorează cantitatea microfiliilor care circulă în sânge și poate fi utilizat fără pericol la fel și animalelor infestate. Nu se recomandă aplicarea medicamentului pe piele umedă și deteriorată, la fel spălatul și scăldatul animalelor în rezervoarele naturale timp de 4 zile după prelucrare.



8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original închis, la loc uscat protejat de acțiunea directă a razelor solare, separat de alimente și furaje, la temperaturi de la 0°C până la 30°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul neutilizat este eliminat în conformitate cu cerințele legislației locale.

Este interzisă utilizarea ambalajelor goale a medicamentului în scopuri casnice, sunt supuse eliminării cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu este destinat utilizării la animale productive.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.

Când se administrează Gelmintal C, trebuie să se respecte termenele recomandate din prospect.

În caz dacă deparazitarea planificată a fost omisă, aceasta trebuie efectuată cât mai curând posibil în aceeași doză.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul manipulării Gelmintal C, să recomandă respectarea regulilor generale de igienă personală și a măsurilor de siguranță, prevăzute în timpul lucrului cu medicamente.

Nu fumați și consumați alimente sau băuturi în timpul aplicării.

La finisarea lucrului, mâinile trebuie spălate bine cu apă caldă și săpun.

Animalele tratate nu trebuie manipulate și nu trebuie să fie permis contactul cu copii timp de 24 ore după prelucrare.

În cazul contactului accidental al medicamentului cu pielea sau membranele mucoase ale ochilor, acestea trebuie spălate cu multă apă.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Gelmintal C.

În cazul reacțiilor alergice sau în caz de ingestie accidentală a medicamentului în organismul uman, trebuie imediat de contactat o instituție medicală (se va prezenta prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).



Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se supun tratamentului femelele gestante sau aflate în lactație.

Utilizarea medicamentului animalelor gestante și lactante este posibilă după o consultație cu medic veterinar.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Gelmintal C nu trebuie utilizat împreună cu medicamente care conțin lactone macrociclice și cu alte medicamente antiparazitare pentru tratamentul animalelor.

Supradozare

În caz de supradozare a medicamentului, la animal pot fi observate slăbiciune, tremor, salivare

În acest caz, medicamentul este spălat bine cu apă și detergent și se aplică măsuri generale pentru înlăturarea acestuia din organism.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de 3 ani de la data producerii.

Este interzisă utilizarea Gelmintal C după data de expirare.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pipete din polimeri x 0,5 ml (pentru căței și câini mai mici de 10 kg), 2,5 ml (pentru câini mai mari de 10 kg).

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

04.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

