

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Trimeroxin comprimate

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
 - Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
 - Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 - Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
 - Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră.
- Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina

tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Trimeroxin comprimate.

1 comprimat (0,8 g de medicament):

Substanțe active:

Sulfadimetoxină de sodiu -250 mg

Trimethoprim – 50 mg

Lista excipienților:

Zahăr pudră, carboximetilceluloză de sodiu, polivinilpirolidonă, carbonat de calciu, stearat de magneziu, aromă.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Tratamentul vițeilor (până la vârsta de 3 luni), ovinelor, caprinelor, porcinelor, câinilor și pisicilor pentru bolile sistemului respirator, ale tractului digestiv și ale sistemului genito-urinar cauzate de microorganisme sensibile la trimetoprim și sulfadimetoxină.

Bovine: tratamentul diareei, bronhopneumoniei catarale, eimerozei, colisepticemiei, salmonelozei, pasteurelozei, pneumoniei, abceselor stafilococice cauzate de microorganisme sensibile la trimetoprim și sulfadimetoxină.



Ovine, caprine: tratamentul pasteurelozei, salmonelozei, colisepticemiei, pneumoniei, diareei cauzate de microorganisme sensibile la trimetoprim și sulfadimetoxină.

Porcine: tratamentul pasteurelozei, colienterotoxemiei, gastroenteritei, salmonelozei, coccidiozei, balantidiozei, pleuropneumoniei, dizenteriei cauzate de microorganisme sensibile la trimetoprim și sulfadimetoxină.

Câini și pisici: tratamentul pneumoniei, micoplasmozei, enterocolitei, salmonelozei, pasteurelozei, coccidiozei, izosporozii, endometritei, mastitei cauzate de microorganisme sensibile la trimetoprim și sulfadimetoxină.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza la animale cu hipersensibilitate la componentele medicamentului, precum și la boli ale organelor hematopoietice, ficatului, rinichilor.

A nu se utiliza la rumegătoarele cu ventricule dezvoltate funcțional.

A nu se utiliza la animale subnutrite.

A nu se utiliza în prima treime a gestației.

5. REACȚII ADVERSE

Keratoconjunctivită uscată, vomă, anorexie, diaree, febră.

6. SPECII ȚINTĂ


Viței (până la vârsta de 3 luni), ovine, caprine, porcine, câini și pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZĂ PRESCRISĂ

Oral cu hrana sau cu apă individual sau în grup la dozele indicate în tabel:

Specii de animale	Prima zi	2, 3, 4, 5 zi
Viței (până la vârsta de 3 luni), ovine, caprine (inclusiv animale tinere)	1 comprimat la 5 kg greutate corporală	1 comprimat la 10 kg greutate corporală
Porci, purcei	1 comprimat la 5 kg greutate corporală	1 comprimat la 10 kg greutate corporală
Câini și pisici	1 comprimat la 10 kg greutate corporală	1 comprimat la 20 kg greutate corporală

Medicamentul este administrat o dată pe zi timp de 5-10 zile cu eimerioză, balantidioză, izosporoză. În cazul protozoarelor, tratamentul animalelor se efectuează în două sau trei cure de câte 5 zile fiecare. Intervalul dintre cure este de 5-10 zile.



8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe - 10 zile

Lapte – 4 zile.

Carnea și laptele primite, înainte de perioada specificată, este folosită drept hrană animalelor neproductive, în funcție de concluzia medicului veterinar.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În loc uscat, ferit de lumină, inaccesibil copiilor, plasat la temperaturi de la +5 până la +25 °C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Utilizarea medicamentului trebuie să se țină cont de politicile antimicrobiene oficiale și locale. Utilizarea medicamentului trebuie să se bazeze pe testele de sensibilitate a bacteriilor colectate din teren.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoanele cunoscute cu hipersensibilitate la substanțele active sau excipienți vor evita contactul cu produsul.

Persoanele care manipulează medicamentul trebuie să poarte echipament de protecție adecvat. Evitați contactul medicamentului cu pielea și ochii.

Nu se va mânca, bea sau fuma în timpul administrării medicamentului.

După utilizarea medicamentului, spălați mâinile cu apă și săpun.

Utilizare în perioada de gestație și lactație:

A nu se utiliza în prima treime a gestației.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Trimetoprimul poate prelungi timpul de protrombină la animalele care primesc anticoagulante.

Sulfonamidele pot deplasa alte medicamente strâns legate de proteine.

Antiacidele, atunci când sunt utilizate simultan cu sulfonamidele, pot reduce biodisponibilitatea acestora.





Supradozare

În caz de supradozaj, se observă pierderea poftei de mâncare, indigestie, diaree și vomă. În caz de supradozaj, trebuie să încetați imediat utilizarea medicamentului. După evacuarea stomacului se vor efectua spălături gastrice (la monogastrice).

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Blistere nr. 10x1, nr. 10x3 și nr. 10x10 în cutii de carton.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

09.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

