



REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

INSEKTOSTOP zgardă 35 cm

2. COMPOZIȚIE CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1,0 g zgardă (bandă din policlorură de vinil) conține:

Substanță activă

Fipronil – 40,0 mg

Excipienți

Bandă din policlorură de vinil.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Zgardă insecto-acaricidă.

Bandă din policlorură de vinil cu fixator.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1. Specii țintă:

Câini, pisici.

4.2 Indicații pentru utilizare cu specificarea speciilor țintă:

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu ectoparaziți: purici (*Ctenocephalides* spp.), păduchi (*Linognathus setosus*), păduchi hematofagi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), căpușe (*Ixodes* spp., *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Haemaphysalis* spp.) în stadii de dezvoltare imitare, nimfale și larvare la câini și pisici.

4.3 Contraindicații:

A nu se administra animalelor bolnave, epuizate și slăbite, precum și animalelor cu sensibilitate la componentele zgărzii!

A nu se administra la animale cu vârsta sub 8 săptămâni!

A nu se administra femelelor pe perioada de gestație și lactație!

4.4. Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu sunt.





4.5. Precauții speciale pentru utilizare:

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

La animale tinere zgarda în jurul gâtului trebuie să se miște liber și să nu împiedice creșterea lor. Pentru cățeluși și motănași în creștere lăsați o rezervă la capătul zgărzii.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În caz de sensibilitate individuală crescută la fipronil și prezența pe mâini a unor zgârieturi sau leziuni ale pielii, fixând zgarda pe animal, folosiți-vă de mănuși din cauciuc.

După ce ați manipulat zgarda, spălați-vă bine pe mâini cu apă caldă și săpun.

În timp ce fixați zgarda pe animal, nu fumați, nu beți și nu mâncați.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):

În unele cazuri, animalele pot prezenta reacții individuale ale pielii (roșeață, mâncărime).

În caz de detectare a unei reacții alergice la un animal sensibil la componentele zgărzii, încetați utilizarea zgărzii, urmând, în caz de necesitate, un tratament simptomatic.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

A nu se administra femelelor pe perioada de gestație și lactație!

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu au fost stabilite.

4.9 Doză și calea de administrare:

Scoateți zgarda din ambalaj și ajustați-o în jurul gâtului animalului în așa fel încât să rămână un spațiu de până la 2 cm între gât și zgardă, apoi fixați-o și tăiați partea în exces.

Zgarda trebuie să se miște liber în jurul gâtului și să nu împiedice creșterea animalului.

Utilizarea continuă a zgărzii protejează animalele de ectoparaziți timp de 4 luni.

O zgardă este concepută pentru un singur animal. În funcție de mărimea animalului, se folosesc zgărzi de diferite lungimi - pentru pisici, rase de câini de talie mică, cățeluși și motănași de la 8 săptămâni - zgardă de o lungime de 35 ± 5 cm.

Se recomandă de a pulveriza periodic așternuturile și obiectele de îngrijire a animalelor cu spray acaricid insecticid INSEKTOSTOP.

4.10 Supradozare:

La utilizarea zgărzii, reacții adverse și semne de supradozaj nu au fost observate.

În caz de ingestie accidentală a zgărzii (dacă animalul roade sau linge zgarda), animalele pot prezenta semne de intoxicație la nivelul sistemului nervos central: ataxie, hiperreactivitate, tremurături, convulsii, vărsături, amețeli, slăbiciune. Nu există un antidot specific. Tratamentul constă în stoparea utilizării zgărzii și efectuarea terapiei simptomatice.





4.11 Perioada de așteptare:

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1. Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică:

ATC vet QP53, ectoparaziticide, insecticide și repelente (QP53AX15, fipronil).

5.1.2 Mecanism de acțiune:

Substanța activă a zgărzii, fipronilul, afectează sistemul nervos central al ectoparaziților, fără a afecta sistemul nervos central al mamiferelor. Mecanismul de acțiune al fipronilului la nevertebrate constă în faptul că acesta inhibă trecerea ionilor de clor în canalele de clorură dependente de GABA (acidul gamma amino butiric) ai ectoparaziților, tulburând activitatea sistemului nervos. Prin blocarea sistemică de către fipronil a sistemului nervos, parvine excitația nervoasă și moartea ectoparaziților.

5.1.3 Efecte farmacodinamice:

Fipronilul aparține familiei chimice fenilpirazol.

Fipronilul omoară puricii în 24 de ore, căpușele și păduchii în decurs de 48 de ore după aplicarea zgărzii.

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică:

Fipronil se utilizează pentru prevenirea și distrugerea puricilor (*Ctenocephalus* spp.), păduchilor (*Linognathus setosus*), căpușelor (*Ixodes* spp., *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Haemaphysalis* spp.,) în stadii de dezvoltare imatură, nimfale și larvare la câini și pisici. De asemenea, s-a dovedit că fipronilul este eficient împotriva păduchilor hematofagi *Trichodectes canis* și *Felicola subrostratus*.

Utilizarea continuă a zgărzii protejează animalele de ectoparaziți timp de 4 luni.

Zgarda este toxică pentru pești și albine.

5.2 Proprietăți farmacocinetice:

Fipronilul acționează prin contact și practic nu se absoarbă în piele. Se acumulează în epidermă, foliculii piloși, glandele sebacee și posedă o acțiune de contact îndelungată. Se creează un efect de „rezervor” care asigură o activitate reziduală pe termen lung a fipronilului.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Bandă din policlorură de vinil.



6.2 Incompatibilități:

Nu au fost stabilite.

6.3 Perioada de valabilitate:

24 (XXIV) luni

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra la loc uscat și întunecat, separat de alimente și furaje, inaccesibil copiilor și animalelor, la o temperatură de 5°C - 25°C.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Zgardă împachetată în folie de aluminiu și ambalată în cutie de carton.

Pentru pisici, rase de câini de talie mică, cățeluși și motănași - zgardă de o lungime de 35 ± 5 cm.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea și neutralizarea medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Zgarda neutilizată sau expirată este eliminată în conformitate cu legislația în vigoare.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SRL «NPP «SUZIRYA», Ucraina, 61093, or. Harkov, str. Poltavskii șleah, 115

tel.: +38 (057) 766-36-36

office@priroda.ua

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

220078

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

25.11.2022

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

11.2022

