

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

INSEKTOSTOP zgardă 70 cm

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Deținătorul:

SRL «NPP «SUZIRYA», Ucraina, or. Harkov, 61093, str. Poltavskii șleah, 115

Producătorul:

SRL «NPP «SUZIRYA», Ucraina, or. Harkov, 61105, str. Zernovaia, 4

tel.: +38 (057) 766-36-36

office@priroda.ua

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

INSEKTOSTOP zgardă 70 cm, zgardă

Zgardă insecto-acaricidă.

Bandă din policlorură de vinil cu fixator.

1,0 g zgardă (bandă din policlorură de vinil) conține:

Substanță activă:

Fipronil – 40,0 mg

Lista excipienților:

Bandă din policlorură de vinil.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu ectoparaziți: purici (*Ctenocephalides* spp.), păduchi (*Linognathus setosus*), păduchi hematofagi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), căpușe (*Ixodes* spp., *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Haemaphysalis* spp.) în stadii de dezvoltare imăginare, nimfale și larvare la câini.





4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra animalelor bolnave, epuizate și slăbite, precum și animalelor cu sensibilitate la componentele zgărzii!

A nu se administra la animale cu vârsta sub 8 săptămâni!

A nu se administra femelelor pe perioada de gestație și lactație!

5. REACȚII ADVERSE

În unele cazuri, animalele pot prezenta reacții individuale ale pielii (roșeață, mâncărime). În caz de detectare a unei reacții alergice la un animal sensibil la componentele zgărzii, încetați utilizarea zgărzii, urmând, în caz de necesitate, un tratament simptomatic.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZĂ PRESCRISĂ

Scoateți zgarda din ambalaj și ajustați-o în jurul gâtului animalului în așa fel încât să rămână un spațiu de până la 2 cm între gât și zgardă, apoi fixați-o și tăiați partea în exces.

Zgarda trebuie să se miște liber în jurul gâtului și să nu împiedice creșterea animalului.

Utilizarea continuă a zgărzii protejează animalele de ectoparaziți timp de 4 luni.

O zgardă este concepută pentru un singur animal. În funcție de mărimea animalului, se folosesc zgărzi de diferite lungimi – pentru rase de câini de talie medie și mare – zgardă de o lungime de 70 ± 5 cm.

Se recomandă de a pulveriza periodic așternuturile și obiectele de îngrijire a animalelor cu spray acaricid insecticid INSEKTOSTOP.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat și întunecat, separat de alimente și furaje, inaccesibil copiilor și animalelor, la o temperatură de 5°C - 25°C .

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Zgarda neutilizată sau expirată este eliminată în conformitate cu legislația în vigoare.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu sunt.





Precauții speciale pentru utilizare la animale:

La animale tinere zgarda în jurul gâtului trebuie să se miște liber și să nu împiedice creșterea lor. Pentru câțeluși în creștere lăsați o rezervă la capătul zgărzii.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În caz de sensibilitate individuală crescută la fipronil și prezenta pe mâini a unor zgârieturi sau leziuni ale pielii, fixând zgarda pe animal, folosiți-vă de mănuși din cauciuc.

După ce ați manipulat zgarda, spălați-vă bine pe mâini cu apă caldă și săpun.

În timp ce fixați zgarda pe animal, nu fumați, nu beți și nu mâncați.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

A nu se administra femelelor pe perioada de gestație și lactație!

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu au fost stabilite.

Supradozare

La utilizarea zgărzii, reacții adverse și semne de supradozaj nu au fost observate.

În caz de ingestie accidentală a zgărzii (dacă animalul roade sau linge zgarda), animalele pot prezenta semne de intoxicație la nivelul sistemului nervos central: ataxie, hiperactivitate, tremurături, convulsii, vărsături, amețeli, slăbiciune.

Nu există un antidot specific. Tratamentul constă în stoparea utilizării zgărzii și efectuarea terapiei simptomatice.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

24 (XXIV) luni

13. STATUT LEGAL

Să eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Zgardă împachetată în folie de aluminiu și ambalată în cutie de carton.

Pentru rase de câini de talie medie și mare – zgardă de o lungime de 70 ± 5 cm.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

11.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

