



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

BA-TICK

soluție ectoparaziticidă pour – on

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
 - Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați - vă medicului veterinar sau farmacistului.
 - Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați -vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 - Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
 - Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră.
- Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

BAVET Ilaç San. ve Tic. A.Ş. İTOSB 12. Cad. Nr: 8/ 34959 Tepeören Tuzla – Istanbul / TURKEY

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

BA-TICK

soluție ectoparaziticidă pour – on

Fiecare ml conține:

Substanța activă:

Flumetrin 10 mg/ml

Lista excipienților:

Butil hidroxi toluen (BHT) 3 mg/ml

3. INDICAȚII TERAPEUTICE:

Soluția pour-on Ba-tick este utilizată pentru prevenirea și tratamentul împotriva muștelor, păduchilor (*Haematopinus eury-sternus*, *Linognathus vituli*, *Bovicola bovis*, *B. ovis*, *Melophagus ovinus*), căpușe, acarieni (scabie) și alți ectoparaziți la bovine, ovine și câini.

Speciile ectoparazitare sensibile sunt căpușele: *Amblyomma sp.*, *Boophilus sp.*, *Hyalomma sp.*, *Rhipicephalus sp.*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor sp.* Scabie: *Psoroptes sp.*

Soluția pour-on Ba-tick este utilizată pentru tratamentul scabiei cauzate de *Demodex canis* la câini.

4. CONTRAINDICAȚII

A se evita aplicarea la animalele despre care se știe că sunt sensibile la substanța activă sau excipienți.





5. REACȚII ADVERSE

Rareori, unele animale pot prezenta semne de disconfort ușor în decurs de 48 de ore de la aplicare. Aceste reacții adverse sunt tranzitorii și dispar într-o perioadă scurtă de timp. Supradozajul trebuie evitat.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine și câine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Se administrează pe osul dorsal, pe linia mediană începând de la regiunea omoplatului până la regiunea osului sacru la bovine, ovine și câini.

Tabel practic de dozare pentru **bovine** (1ml / 10 kg greutate corporală)

Greutate corporală	Doza pentru aplicare
Până la 100 kg	10 ml
100 - 200 kg	20 ml
200 - 300 kg	30 ml
300 – 400 kg	40 ml
Mai mare de 400 kg	50 ml

După deschiderea flaconului, strângeți flaconul pentru a umple dozimetrul până la nivelul cerut. Medicamentul de uz veterinar din dozimetru este aplicat pe coloana vertebrală pe linia mediană a animalului.

Tabel practic de dozare pentru **ovine** (pentru 1ml/10 kg greutate corporală).

Greutate corporală	Doza pentru aplicare
10 kg	1 ml
15 kg	1,5 ml
20 kg	2 ml
30 kg	3 ml
40 kg	4 ml
50 kg	5 ml

După deschiderea flaconului, strângeți flaconul pentru a umple dozimetrul până la nivelul cerut. Medicamentul din dozimetru este aplicat pe coloana vertebrală pe linia mediană a animalului.





La ovine medicamentul se administrează pe două căi:

A. Ovinelor tunse prin aplicare pe coloana vertebrală pe linia mediană. Dacă lâna animalului este lungă și nu este tunsă, atunci lâna trebuie întinsă bine pentru a ajunge la piele și medicamentul este aplicat pe linia mediană.

B. Cu ajutorul unei seringi (5 ml) fără ac, medicamentul se aplică pe locurile fără lâna și păr între membrele anterioare și posterioare precum și pe părțile laterale ale abdomenului animalului așezat pe șolduri.

Scabie psoroptică:

Dacă există infestări cu râie și păduchi, trebuie aplicată doza dublă de la dozele menționate mai sus.

Câini:

Împotriva scabiei cauzate de *Demodex canis* se administrează 1 ml/10 kg greutate vie. La fel ca și la aplicarea directă pe leziunile scabie, medicamentul va fi aplicat prin coloana vertebrală de la regiunea nasului până la regiunea osului sacrum pe linia mediană.

Dacă se efectuează un tratament suplimentar de iarnă, numărul de căpușe care vor infesta animalele va fi redus semnificativ.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Este zero zile pentru carne și lapte la bovine.

Zero zile pentru carnea de ovine.

Nu se va aplica ovinelor care sunt crescute pentru producerea de lapte destinat consumului uman.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Loc ferit de lumină, depozitați în condiții uscate și răcoroase sub 25°C, ferit de îngheț.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Containerele goale, resturile vor fi îngropate în gropi adânci și nu vor fi utilizate în alte scopuri. Albinele melifere, peștii și alte acvaculturi sunt foarte sensibile la flumetrină. Prin urmare apele contaminate cu medicamentul de uz veterinar, resturile și recipientele goale nu trebuie aruncate în râuri, lacuri, iazuri și nu vor fi folosite pe stupii de albine și împrejurimile acestora.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Dozele recomandate nu trebuie depășite. Medicamentul nu trebuie aplicat în condiții de temperatură ridicată. Medicamentul de uz veterinar nu trebuie aplicat în jurul ochilor și gurii, precum și pe pielea puternic afectată. Pentru a evita infestarea cu paraziți, toate animalele trebuie tratate înainte de a intra în efectivul de animale.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Soluția pour-on Ba-tick este destinată utilizării împotriva infestărilor cu ectoparaziți prin aplicarea pe partea din spate a pielii și pe părțile infestate ale corpului.



Pentru o eradicare eficientă, încăperile pentru animale trebuie de asemenea să fie dezinfectate. Nu lăsați animalele să se înmoaie în sursele de apă și evitați linsul animalelor unul pe altul după aplicare. Medicamentul de uz veterinar își păstrează eficiența chiar și după expunerea la ploaie nu reduce efectul de sterilitate (ovulație nefertilă) asupra căpușelor femele. Cu toate acestea, condițiile de mediu, numărul populației de căpușe afectează perioada de prevenire a medicamentului de uz veterinar.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoana care va aplica medicamentul de uz veterinar trebuie să poarte haine de protecție și mănuși de cauciuc. Aplicarea trebuie făcută în condiții bine ventilate sau în aer liber.

Medicul trebuie să evite contactul direct cu medicamentul de uz veterinar.

Dacă are loc vreo scurgere, zona afectată trebuie spălată cu apă cât mai curând posibil.

Dacă accidental ați înghițit medicamentul, nu încercați să vomitați ci adresați-vă unui medic cât mai curând posibil. Citiți prospectul înainte de utilizare. Consultați medicul veterinar înainte de utilizare și în cazul în care apare un efect neașteptat. A nu se păstra la îndemâna copiilor și împreună cu produse alimentare. Nu cumpărați medicamente expirate și deteriorate.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu au fost raportate complicații legate de utilizarea în timpul gestației.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Flumetrin și alți piretroizi atunci când sunt utilizați în condiții *in vivo* împreună sau în combinație cu insecticide organice cu fosfor, activitatea lor de inhibare asupra sistemului enzimatic microzomal hepatic și efectul neurotoxic poate crește, acest lucru poate crește toxicitatea medicamentului pentru mamifere. Efectul care inhibă sistemul imunitar devine evident.

Supradozare:

Toxicitatea flumetrinei este limitată atunci când este aplicată pe piele. Atunci când este detectată o reacție adversă, trebuie să consultați medicul veterinar și să se efectueze un tratament simptomatic. Nu există un antidot specific.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate este de 24 luni de la data producerii.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane HDPE de 100 ml și 500 ml din plastic în cutie de carton.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

