

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Surfagon VBF se administrează intramuscular în următoarele doze:

- **Inducerea ciclului estral post-partum la vaci.** Se administrează o singură doză de 10 ml la a 8-12 zi după fătare. Necătfind la căldurile declanșate, acestea se înseminează (montează) nu mai devreme decât peste 45 de zile după fătare.
- **Tratamentul hipotrofiei ovariene (hipofuncție gradul I și II) la vaci:** Se administrează de 2 ori: prima administrare 10 ml la 8-12 zi a ciclului estral; a doua administrare peste 10 zile în volum de 5 ml. În cazul hipofuncției severe: la prima, a treia și a cincea 5 zi, se administrează i/muscular 10 ml de soluție uleioasă de progesteron 1% și la 7 zi - 10 ml de Surfagon VBF.
- **Tratamentul chiștilor foliculari:** Se aplică 3 administrări cu interval de 24 ore, vacilor - 5 ml, junincilor - 3 ml. La vaci poate fi administrată o singură doză, intravenos 50 mkg. La 11 zi după administrare se injectează i/muscular estrofan 250 mkg, de 2 ori cu interval de 10-12 ore. La a 3-6 zi după estrofan se dezvoltă foliculi sănătoși, se normalizează ciclul estral și animalele se înseminează la momentul survenirii căldurilor.
- **Prevenirea mortalității embrionare:** Se administrează o dată la vaci - 10 ml la 8-12 zile după însămințare pentru sporirea activității funcționale a corpului galben.
- **Stimularea ovulației și sporirea ratei de fecundare la vaci:** după 2-3 însămințări nefertile la a 10-14 zi a ciclului estral, i/muscular, cu interval de 10-12 ore se administrează estrofan în doză de 250 mkg. La manifestarea căldurilor sau la 70 de ore după prima aplicare a estrofanului, se administrează 10 ml de Surfagon VBF și vacile se înseminează. La a 8-12 zi după însămințare, se administrează repetat 10 ml de Surfagon VBF.
- **Stimularea căldurilor și sporirea ratei de fecundare la scroafe:** la 24-48 de ore de la înțărirea purceilor se administrează PMSG (gonadotropină serică de la iepe gestante) 1000 UI și peste 56 ore se administrează 10 ml de Surfagon VBF. Înseminarea scroafelor se va efectua conform instrucțiunii.
- **Stimularea căldurilor și sporirea ratei de fecundare la scroafe:** la 24-48 de ore de la înțărirea purceilor se administrează PMSG (gonadotropină serică de la iepe gestante) 1000 UI și peste 56 ore se administrează 10 ml de Surfagon VBF. Înseminarea scroafelor se va efectua conform instrucțiunii.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

0 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la $T^{\circ}\text{C} +2^{\circ}+10^{\circ}\text{C}$, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Surfagon VBF neutilizat se elimină conform reglementărilor locale în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se elimină cu deșeurile menajere.





11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularități deosebite în acțiunea medicamentului la prima lui administrare sau la anularea lui, nu au fost înregistrate.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Surfagon VBF, este important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamentele de uz veterinar.

Persoanelor cu hipesensibilitate li se recomandă evitarea contactului direct cu Surfagon VBF.

În caz de contact accidental cu pielea sau cu mucoasa oculară, acestea se spală din abundență cu apă. În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul).

În timpul manipulării cu Surfagon VBF se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi.

La finisarea lucrului mâinile se spală cu apă și săpun.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Surfagon VBF poate fi administrat la vaci în termen de 12 zile de la însămânțare, ulterior pe parcursul gestației nu se folosește. Nu se recomandă a fi administrat scroafelor gestante și tineretului.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu există date.

Incompatibilități:

Nu poate fi amestecat în aceeași seringă cu alte medicamente.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

După deschidere, eventuale resturi de medicament nu se păstrează.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din sticlă a câte 10; 20; 30; 50 și 100 ml, cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

02.2023

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a

Tel/fax +373 022 855-071, Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

