



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

TETRAVIN
soluție injectabilă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR
Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”, str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina
tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

1 ml de medicament conține:

Substanța activă:

Vitamina A - 50 000 UI;
Vitamina D₃ - 25 000 UI;
Vitamina E – 20 mg;
Vitamina F – 5 mg.

Lista excipienților:

Hidroxitoluen butilat, ulei de floarea soarelui.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Prevenirea și tratamentul hipovitaminozelor, osteodistrofii alimentare și secundare, cetoză, rahitism, hipocalcemie și hipofosfatemie postpartum, distocii postpartum, urolitiază, bronhopneumonii, boli gastrointestinale, boala mușchilor albi, metrită, fracturi osoase, stimularea creșterii și dezvoltării animalelor tinere, precum și a funcției reproductive la masculii reproducători.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu sunt.





5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Medicamentul se administrează intramuscular sau subcutanat, în scop profilactic, peroral, o dată la 7-10 zile, în scop terapeutic - timp de 5 sau 7 zile, până la recuperare (6-8 administrări), apoi se trece la doze profilactice. Per os medicamentul se utilizează zilnic în dozele profilactice indicate în tabelul de mai jos.

Specia de animale	Doza medicamentului, ml, i/m s/c		Doza per os, ml/zi
	De profilaxie, o data la 10 zile	De tratament, o dată la 5 zile	
Vaci în repausul mamar	10-12	10-12	—
Vaci în lactație cu productivitatea 6-10 mii litri de lapte	12-15	12-15	—
Tineretul bovin (la 100 kg m. c.)	4-5	5-6	0,5-0,6
Ovine, caprine	1-1,5	1,5-2	0,2-0,25
Scroafe (30-45 zile pînă la fătare)	5	5-6	0,4-0,5
Scroafe în lactație	5-6	6-7	0,6-0,7
Purcei (20-40 kg)	1,0-1,5	1,0-1,5	0,2-0,25
Iepe în gestație	7-8	8-10	1,0
Iepe în lactație	8-10	10-12	1,5
Tineretul cabalinelor cu vîrsta 6-12 luni.	2,0	2,0-3,0	0,2-0,3

Dozele medicamentului sunt calculate în funcție de vitamina A.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe - zero zile.

Lapte - zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Loc uscat și întunecat, inaccesibil copiilor la o temperatură de la +5 până la +15 ° C.





10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie ținută:

Nu sunt.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Când se utilizează medicamentul, dietele animalelor trebuie să fie echilibrate în ceea ce privește proteinele, calciul, fosforul, magneziul și oligoelementele.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când lucrați cu medicamentul, este necesar să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

Utilizare în perioada de gestație și lactație:

Medicamentul poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu sunt.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

24 luni.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din sticlă de culoare închisă, sigilate cu dopuri de cauciuc sub o capsă de aluminiu, în volum de 10, 50, 100 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

03.2023

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

