

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Vaccin viu liofilizat împotriva tricofitiei bovine

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OAŌ"BelVitunifarm", 211309, or. Dolja, str.Sovetskaia 26A, or.Vitebsk, reg.Vitebsk, Republica Belarus.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Vaccin viu, liofilizat împotriva tricofitiei bovine.

Substanța activă:

1 doză de vaccin conține de la 20 la 60 mln. micronidii viabile de *Trichophyton verrucosum*.

Tulpină vie atenuată liofilizată a fungilor *Trichophyton verrucosum* (TF-130 L, VGNKI), crescut pe mediu nutritiv solid.

Se prezintă ca o masă omogenă, deshidratată, atenuată, în formă comprimată de culoare de la gri-deschis la crem.

Suspensie injectabilă din reconstituirea liofilizatului cu diluantul.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Pentru prevenirea și tratamentul tricofitiei bovine.

Imunitatea la animalele vaccinate se instalează peste 30 zile după revaccinare și durează nu mai puțin de 7 ani.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra animalelor cu febră și cu semne de cașexie.

Nu se administrează vițelilor cu vârsta sub 14 zile și vacilor gestante în ultimul trimestru.

Este interzisă administrarea utilizarea vaccinului în gospodăriile nefavorabile la boli infecțioase acute până la lichidarea acestor infecții.



5. REACȚII ADVERSE

În urma administrării vaccinul viu, liofilizat împotriva tricofitiei bovine, conform prospectului de utilizare, reacții adverse și complicații nu apar. În caz de apariție a complicației, administrarea se stopează și se recurge la terapie simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Pentru a fi administrat, liofilizatul se diluiază cu soluție izotonică de clorură de sodiu.

Pentru aceasta cu o seringă sterilă, respectând regulile de aseptică, în flaconul cu liofilizat se adaugă 5 ml de diluant și se agită pentru a obține o suspensie omogenă.

Suspensia obținută cu seringă se transferă în flacon steril și se adaugă diluant în raport de 5 ml /o doză de vaccin. Vaccinul astfel diluat este gata pentru administrare.

Exemplu: În flacon cu 20 doze de vaccin se introduce 5 ml de diluant steril, se agită până la obținerea suspensiei omogene.

Suspensia se transferă cu seringă într-un flacon steril (volum corespunzător), unde se mai adaugă 95 ml de diluant steril.

Vaccinul se administrează intramuscular în regiunea lombară.

Locul injectării se tunde și se dezinfectează. Se folosesc ace și seringi sterile, separat pentru fiecare animal.

Preventiv se administrează două doze la interval de 10-14 zile :

-viței de la 14 zile – la 4 luni- 5 ml;

-viței de la 4 luni și animale adulte – 10 ml.

Curativ se administrează două doze la interval de 10-14 zile:

-viței de la 14 zile – la 4 luni- 10 ml;

-viței de la 4 luni și animale adulte – 20 ml.

Vițeele de la vârsta de 14 zile, din gospodării favorabile și nefavorabile de tricofitie, se vaccinează obligatoriu. Timp de 30 de zile se urmăresc animalele imunizate.

Reacție normală este apariția în locul injectării unei cruste de până la 20 mm în diametru care dispare de la sine peste 20-25 de zile.

Efectul curativ se observă peste 20- 30 zile și se manifestă prin descuamarea crustelor și dispariția modificărilor tegumentare. Pentru accelerarea descuamării, pe suprafețele afectate se aplică remedii emoliente - untură de pește, vaselină, ș.a.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne - 10 zile. Carcasele obținute până la expirarea termenului limită se folosesc conform rezultatelor expertizei sanitar-veterinare.

Lapte - 0 zile.



9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, la T°C de la + 2°C până la +10°C. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul de uz veterinar nefolosit se elimină conform reglementării locale, ambalajele se elimină cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Se supun vaccinării toți vițeii de la vârsta de 14 zile.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Animalele vaccinate în faza de incubatie a bolii, pot manifesta simptome de tricofitie.

Aceste animale se vaccinează suplimentar o dată, cu o doză curativă.

Gruparea, transportarea animalelor vaccinate se permite fără restricții peste o lună de la ultima administrare a vaccinului.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu vaccinul viu, liofilizat împotriva tricofitiei bovine, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar biologice.

Persoanelor cu hipersensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu vaccinul viu, liofilizat împotriva tricofitiei bovine.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă. În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

În timpul lucrului se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi.

La finisarea lucrului mâinile se spală cu apă și săpun.

Înainte de administrare vaccinul trebuie diluat cu soluție izotonică sterilă.

După diluare se va folosi timp de 8 ore. Vaccinul nefolosit se va inactiva prin fierbere (30 minute).

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu se administrează vacilor gestante în ultimul trimestru a gestației.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu sunt date înregistrate.

Supradozare

Nu sunt date înregistrate.

Incompatibilități:

În absența studiilor de incompatibilitate, acest vaccin nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63

ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

APROBAT

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate: 18 luni din data producerii cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare.

Perioada de valabilitate după reconstituire: 8 ore.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din sticlă cu volumul de 10 ml a câte 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 și 40 doze, cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

04.2023

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, mun. Chișinău, str. Camenița 4a

Tel/fax +373 022 855-071

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

