

PROSPECT

IVERMECTINĂ pulbere microgranulată antiparazitară

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

Numele și adresa: „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,
s. Merenii Noi
telefon: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39
e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR IVERMECTINĂ

pulbere microgranulată antiparazitară, numai de uz veterinar.

3. DECLARAȚIA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTI

1,0 g pulbere conține:

Substanța activă:

Ivermectină – 3,5 mg
Acetat de tocoferol – 20,0 mg

Excipienți:

Amidon de porumb – 976,5 mg

4. INDICAȚII TERAPEUTICE

Indicat în dehelmintizarea curativ – preventivă a suinelor în cazul monoinvaziilor și invaziilor asociate.
Este recomandat în combaterea următoarelor parazitoze:

Suine: helmintoze provocate de formele larvale și adulte a nematodelor (*Ascaridae*, *Metastrongylidae*, *Oligacanthorhynchidae*, *Ollulanidae*, *Strongyloididae*, *Trichonematidae*, *Trichuridae*), acaroze provocate de (*Demodex phylloides*, *Sarcoptes parvula*, *S. suis*) la fel și păduchi (*Haematopinus suis*).

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

6. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

7. SPECII ȚINTĂ

Suine

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Medicamentul de uz veterinar se administrează per os (pe cale orală), prin incorporare în furaj, în grup.

Suine: (după înțărcare și la îngrășat) – doza zilnică recomandată este 2,0 g IVERMECTINĂ pulbere/10 kg greutate corporală, consecutiv 7 zile.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie determinată cu acuratețe cât mai mare.

Dacă animalele vor fi tratate colectiv, acestea trebuie grupate în funcție de greutatea corporală pentru a evita subdozarea sau supradozarea.

Paralel se va efectua dezinsecția încăperilor.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne – 15 zile.



11. PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra în loc uscat, la temperatura 15 - 25°C, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

Perioada de valabilitate în ambalaj original – 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 3 luni.

Perioada de valabilitate după diluare în hrană – 7 zile.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Animalele tratate nu trebuie să intre în contact cu animalele infestate, cu adăposturile sau solul contaminat deoarece pot fi reinfestate și retratarea să fie necesară. Efectul ivermectinei asupra râiei nu este imediat de aceea trebuie evitat contactul animalelor tratate cu cele netratate timp de cel puțin o săptămână. Deoarece ouăle de păduchi nu sunt afectate de ivermectină și eclozarea lor poate dura până la trei săptămâni, poate fi necesară repetarea tratamentului.

Se recomandă evitarea următoarelor practici, deoarece acestea cresc riscul de dezvoltare al rezistenței paraziților și pot face terapia inefficientă:

- utilizarea prea frecventă și repetată a antihelminticilor din aceeași clasă, pe o perioadă prea mare;
- subdozarea, datorită subestimării greutateii corporale, administrarea incorectă a medicamentului de uz veterinar, decalibrarea echipamentului de dozare (dacă se folosește).

Cazurile clinice suspecte de rezistență la antihelmintice trebuie investigate în continuare folosind teste specifice (ex. Testul reducerii ouălor din fecale). Atunci când rezultatele testelor dovedesc rezistența la un anumit antihelmintic, trebuie folosit un antihelmintic care aparține unei alte clase farmacologice și care are alt mod de acțiune.

Precauții speciale de utilizare la animale:

Medicamentul de uz veterinar nu trebuie administrat ca atare. La administrare, pentru o bună dozare a substanțelor active, se va face un preamestec care se va încorpora în furaj.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Se va manipula medicamentul de uz veterinar cu grijă, de respectat dozele indicate.

În caz de reacții neprevăzute în prospect solicitați imediat sfatul medicului și prezentați acestuia prospectul medicamentului de uz veterinar sau eticheta.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

Nu se cunosc.

Supradozare:

Nu depășiți doza recomandată.

Incompatibilități:

În absența studiului de compatibilitate a nu se amesteca cu alte medicamente de uz veterinar.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul de uz veterinar nu trebuie aruncat în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea lor, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și nu se vor utiliza în fertilizarea solului.





14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATA PROSPECTUL

29.05.2023

15. ALTE INFORMAȚII

Natura și compoziția ambalajului primar:

Pungi termosudabile de peliculă tip GK 50/12 PE/7 μm Alu/25 PE cu capacitatea de: 10 g și 1 kg.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

