

Anexa nr. 2

Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

APROBAT

PROSPECT

CASTRIN
suspensie injectabilă

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

Întreprinderea particulară „O.L.KAR-AgroZooVet-Service”,
str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272 B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina
tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27
e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

CASTRIN suspensie injectabilă

Suspensie injectabilă, de culoare albă cu nuanță gălbuie, care se stratificată în timpul depozitării și ușor se omogenizează la agitare.

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 ml de medicament conține (mg):

Substanța activă:

Medroxiprogesteron acetat – 50,0

Excipienți: parahidroxibenzoat de metil, parahidroxibenzoat de propil, clorură de sodiu, polisorbitat 80, oxid de polietilenă 1500, apă pentru preparate injectabile.

4. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Pentru prevenirea sau întreruperea pe termen lung a estrului la pisici și cățele și prevenirea gestației nedorite; tratamentul gestației false și pseudolactației cățelelor; tratamentul nimfomaniei la pisici.

5. CONTRAINDICAȚII

Boli ale organelor genitale (piometrită, metrită, endometrită etc.) și ale sistemului urinar. Întreținerea cățelelor și pisicilor în scopul de a produce urmași.

Tumori ale glandei mamare, tratament cu alți estrogeni și progestageni.

Imaturitatea sexuală, gestație, alăptarea și estru.

Hipersensibilitate la medicament.

6. REACȚII ADVERSE

Nu sunt înregistrate.

7. SPECII ȚINTĂ

Cățele și pisici.



8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Medicamentul se administrează o singură dată subcutanat în regiunea greabănelului sau intramuscular în regiunea coapsei în doze:

a) pentru tratamentul gestației false și pseudolactației: pentru cățelele cu o masă corporală de până la 10 kg - 0,5 ml de medicament, de la 10 la 20 kg - 1 ml, mai mult de 40 kg - 3 ml.

b) pentru a preveni apariției estrului - cu 5-10 zile înainte de apariția lui, pentru a-l întrerupe - pe parcursul 1-2 zile de la apariția primelor semne (schimbarea comportamentului, apariția secrețiilor mucoase cu amestec de sânge, atractivitate pentru animale (câini) de sex opus):

- cățele cu masă corporală de 2-5 kg - 1-1,5 ml de medicament; 5-10 kg - 1,5-2 ml; 10-20 kg - 2-3 ml; 20-30 kg - 3-4 ml; 30-40 kg - 4-5 ml; mai mult de 40 kg - 5-6 ml.

- pisici cu masa corporală de până la 3 kg - 0,5 ml de medicament; mai mult de 3 kg - 1-2 ml.

c) în tratamentul nimfomaniei la pisici - 0,5-1 ml de medicament.

Pentru prevenirea estrului, medicamentul este administrat o singură dată la cățele cu cel puțin o lună înainte de estrul presupus, iar la pisici, imediat după următorul estru.

Pentru protecția pe termen lung a estrului, medicamentul se administrează cu 5-10 zile înainte de debutul estrului, se repetă pentru cățele după 5-6 luni, pentru pisici - după 4-6 luni.

Pentru pisicile siameze, doza este determinată individual de medicul veterinar.

Înainte de utilizare, agitați bine conținutul flaconului până când se obține o suspensie omogenă.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu utilizați CASTRIN suspensie-injectabilă dacă observați semne vizibile de deteriorare a ambalajului primar.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Loc uscat și întunecat, inaccesibil copiilor, la o temperatură de la +5 °C până la 25 °C.

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

După prima deschidere a flaconului, medicamentul trebuie utilizat în 10 zile, cu condiția să fie păstrat într-un loc întunecat la o temperatură de până la 8 °C.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu se recomandă ca acest produs să fie administrat la alte specii decât cățele și pisici.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu se administrează animalelor în primul lor estru.

Nu administrați medicamentul în perioada postoperatorie.

Nu este recomandat pentru cățelele din rasa Ogar.



În unele cazuri, suprimarea estrului poate fi permanentă.

La femele și pisici, după administrarea medicamentului, se poate păstra capacitatea de fertilizare timp de 10 zile.

După întreruperea administrării medicamentului, se recomandă împerecherea animalelor după al doilea estru.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când lucrați cu medicamentul, este necesar să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

Utilizare în perioada de gestație sau lactație:

Nu se administrează în perioada de gestație și de alăptare.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se recomandă tratamentul concomitent cu alți estrogeni și progestageni.

Supradozare:

Supradozarea este improbabilă.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor de uz veterinar care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

16.06.2023

15. ALTE INFORMAȚII

Dimensiunile ambalajelor:

Flacoane sau fiole a câte 2 ml, închise cu dop de cauciuc și o capsă de aluminiu deasupra, într-o cutie de carton.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.