

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR****1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR ȘI CONCENTRAȚIA**

CASTRIN, suspensie injectabilă

**2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**

1 ml de medicament conține (mg):

**Substanța activă:**

Medroxiprogesteron acetat – 50,0

**Excipienți:**

Parahidroxibenzoat de metil – 7,0;

Parahidroxibenzoat de propil – 66,5;

Clorură de sodiu – 9,0;

Polisorbat 80 – 1,5;

Oxid de polietilenă 1500 – 200,0;

Apă pentru preparate injectabile – până la 1 ml.

**3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Suspensie injectabilă, de culoare albă cu nuanță gălbuie, care se stratificată în timpul depozitării și ușor se omogenizează la agitare.

**4. PARTICULARITĂȚI CLINICE****4.1 Specii-țintă:**

Cățele și pisici.

**4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă:**

Pentru prevenirea sau întreruperea pe termen lung a estrului la pisici și cățele și prevenirea gestației nedorite; tratamentul gestației false și pseudolactației cățelelor; tratamentul nimfomaniei la pisici.

**4.3 Contraindicații:**

Boli ale organelor genitale (piometrită, metrită, endometrită etc.) și ale sistemului urinar. Întreținerea cățelelor și pisicilor în scopul de a produce urmași.

Tumori ale glandei mamare, tratament cu alți estrogeni și progestageni.

Imaturitatea sexuală, gestație, alăptarea și estru.

Hipersensibilitate la medicament.

**4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:**

Nu se recomandă ca acest produs să fie administrat la alte specii decât cățele și pisici.

**4.5 Precauții speciale pentru utilizare:****Precauții speciale pentru utilizare la animale:**

Nu se administrează animalelor în primul lor estru.

Nu administrați medicamentul în perioada postoperatorie.

Nu este recomandat pentru cățelele din rasa Ogar.

În unele cazuri, suprimarea estrului poate fi permanentă.

La femele și pisici, după administrarea medicamentului, se poate păstra capacitatea de fertilizare timp de 10 zile.

După întreruperea administrării medicamentului, se recomandă împerecherea animalelor după al doilea estru.





**Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:**

Când lucrați cu medicamentul, este necesar să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

**4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):**

Nu sunt înregistrate.

**4.7 Utilizare în perioada de gestație sau lactație:**

Nu se administrează în perioada de gestație și de alăptare.

**4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:**

Nu se recomandă tratamentul concomitent cu alți estrogeni și progestageni.

**4.9 Doză și calea de administrare:**

Medicamentul se administrează o singură dată subcutanat în regiunea greabăului sau intramuscular în regiunea coapsei în doze:

a) pentru tratamentul gestației false și pseudolactației: pentru cățelele cu o masă corporală de până la 10 kg - 0,5 ml de medicament, de 10 - 20 kg - 1 ml, mai mult de 40 kg - 3 ml.

b) pentru a preveni apariției estrului - cu 5-10 zile înainte de apariția lui, pentru a-l întrerupe - pe parcursul 1-2 zile de la apariția primelor semne (schimbarea comportamentului, apariția secrețiilor mucoase cu amestec de sânge, atractivitate pentru animale (câini) de sex opus):

- cățele cu masă corporală de 2-5 kg - 1-1,5 ml de medicament; 5-10 kg - 1,5-2 ml; 10-20 kg - 2-3 ml; 20-30 kg - 3-4 ml; 30-40 kg - 4-5 ml; mai mult de 40 kg - 5-6 ml.

- pisici cu masa corporală de până la 3 kg - 0,5 ml de medicament; mai mult de 3 kg - 1-2 ml.

c) în tratamentul nimfomaniei la pisici - 0,5-1 ml de medicament.

Pentru prevenirea estrului, medicamentul este administrat o singură dată la cățelele cu cel puțin o lună înainte de estrul presupus, iar la pisici, imediat după următorul estru.

Pentru protecția pe termen lung a estrului, medicamentul se administrează cu 5-10 zile înainte de debutul estrului, se repetă pentru cățele - după 5-6 luni, pentru pisici - după 4-6 luni.

Pentru pisicile siameze, doza este determinată individual de medicul veterinar.

Înainte de utilizare, agitați bine conținutul flaconului până când se obține o suspensie omogenă.

**4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi):**

Supradozarea este improbabilă.

**4.11 Perioada de așteptare:**

Nu este cazul.

**5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE**

**Grupa farmacoterapeutică:** Contraceptive hormonale pentru uz sistemic (progesteroni).

**Codul veterinar ATC:** QG03AC06





Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor  
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63

ÎNREGISTRAREA DE STAT  
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

**APROBAT**

**7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE**

Întreprinderea particulară „O.L.KAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272 B, or. Șargorod, reg. Vinița, Ucraina, 23500,

tel.: +38 (043) 442-12-54, fax: +38 (043) 442-17-87

e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

**8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE**

230057

**9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE** (sau data reînnoirii  
certificatului de înregistrare)

16.06.2023

**10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI**

06.2023

**INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE**

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

