

**PROSPECT**

Ceftiosan<sup>R</sup>, suspensie injectabilă

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE**

OOO „Apicenna”, or. Moscova, r. Balașiha, ș. Poltevscoe, 4.

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

Ceftiosan<sup>R</sup>, suspensie injectabilă

**3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)**

*1 ml de Ceftiosan<sup>R</sup> conține:*

**Substanțe active:**

clorhidrat de ceftiofur - 50 mg

**Excipienți:**

Monostearat de aluminiu - 10 mg, sorbitan monoleat - 10 mg, alcool benzilic și trigliceride cu lanț mediu.

**4. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)**

Ceftiosan<sup>R</sup> se indică în scopuri terapeutice *bovinelor* în cazul bolilor infecțioase a organelor respiratorii, necrobacteriozei și endometritelor acute postpartum; *porcinelor* în cazul infecțiilor respiratorii; *cailor de sport* în cazul bolilor infecțioase a organelor respiratorii, a țesuturilor moi și pielii și altor infecții de etiologie bacteriană, agenții patogeni care sunt sensibili la ceftiofur.

**5. CONTRAINDICAȚII**

Sensibilitatea individuală sporită la antibioticele  $\beta$ -lactamice.

**6. REACȚII ADVERSE**

La administrarea conform prospectului dat, reacții adverse sau complicații nu apar. Unele animale în locul inoculării pot manifesta o reacție locală sub formă de edem, care trece de la sine, timp de 1-2 zile. În caz de sensibilitate individuală sporită și apariție a reacțiilor adverse sau a complicațiilor, administrarea se stopează și se recurge la terapie desensibilizantă.

**7. SPECII ȚINTĂ**

Bovine, porcine, cabaline de sport.

**8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE**

Ceftiosan<sup>R</sup> se administrează parenteral, o dată în zi:

- Bovine - subcutanat, în doză de 1 ml / 50 kg greutate corporală (1 mg ceftiofur la 1 kg de greutate corporală), în bolile cailor respiratorii, timp de 3-5 zile, în necrobacterioze timp de 3 zile, în endometrite timp de 5 zile;
- Porcinelor - intramuscular în doză de 1 ml /16 kg greutate corporală (3 mg ceftiofur la 1 kg de greutate corporală) timp de 3 zile;
- Cabalinelor (neproductive) - intramuscular în doză de 1 ml/20 kg greutate corporală în latura gâtului (2,5 mg ceftiofur/1 kg greutate corporală) timp de 5 zile.



## 9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

A se agita înainte de administrare pentru a omogeniza suspensia.

Se recomandă respectarea schemelor de administrare pentru a nu diminua din eficiența medicamentului.

În caz de omitere a unui dozaj, administrarea se reia cât de repede posibil în aceeași doză, conform aceeași scheme.

## 10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

carne bovine - 8 zile,

carne porcine - 6 zile,

lapte - 0 zile.

## 11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original.

A se proteja de lumina directă.

A se păstra separat de produse alimentare și nutrețuri.

A se păstra la temperatura de la +5 °C până la +25 °C.

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

## 12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

### Precauții speciale pentru utilizare la animale

La utilizarea medicamentului de uz veterinar trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale. Utilizarea medicamentului trebuie să se bazeze pe testarea susceptibilității bacteriilor izolate de la animal. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se bazeze pe informații epidemiologice locale (la nivel regional sau de fermă) cu privire la susceptibilitatea bacteriilor țintă.

Utilizarea medicamentului care se abate de la instrucțiunile furnizate în prospect poate crește prevalența rezistenței bacteriene la ceftiofur și poate să reducă eficacitatea acestuia.

Particularități deosebite în acțiunea medicamentului de uz veterinar la prima lui administrare sau la stoparea lui nu au fost înregistrate.

Se recomandă respectarea schemei de administrare a medicamentului de uz veterinar pentru a nu diminua eficiența lui. În caz de omitere a unei doze, e important ca ea să fie administrată cât de repede posibil și apoi revenind la același interval.

### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale

Este important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

În timpul lucrului se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi.

La finisarea lucrului mâinile se spală cu săpun.

Persoanelor hipersensibile la componentele medicamentului de uz veterinar li se recomandă evitarea contactului direct cu Ceftiosan<sup>R</sup>.

În caz de contact accidental a medicamentului de uz veterinar cu pielea sau cu tunicile mucoase oftalmice, ele se spală din abundență cu apă.

În caz de apariție a reacției alergice sau la ingerare, e important de adresat la o instituție medicală cât de repede posibil (cu sine de avut eticheta sau prospectul).



#### **Utilizare în perioada de gestație sau de lactație**

Femelelor gestante și în lactație a se administra sub controlul medicului veterinar, în baza evaluării raportului risc-beneficiu.

#### **Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune**

Nu se recomandă administrarea medicamentului de uz veterinar Ceftiosan<sup>R</sup> concomitent cu tetraciclinele sau levomicetina, din cauza diminuării acțiunii sale bactericide, administrarea simultană cu aminoglicozidele, furosemidul și acidul etacridinic poate spori efectul nefrototoxic.

#### **Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz**

În caz de supradozare animalul poate manifesta inapetență sau o reacție locală tranzitorie.

#### **Incompatibilități majore**

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

### **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Ambalajele deșerte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

### **14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL**

12.2023

### **15. ALTE INFORMAȚII**

Dimensiuni de ambalaje:

#### Ambalaj primar:

Flacoane din sticlă întunecată a câte 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 și 250 ml închise cu dop din cauciuc și sigilate cu capac din aluminiu.

#### Ambalaj secundar individual:

Cutie din carton individuală care conține:

1 flacon din sticlă întunecată x 10 ml

1 flacon din sticlă întunecată x 20 ml

1 flacon din sticlă întunecată x 50 ml

1 flacon din sticlă întunecată x 100 ml

#### Cutie din carton colectivă care conține:

10 cutii din carton individuale x 1 flacon 100 ml fiecare;

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.



TABLE  
CONTENTS

