

## REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### 1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR ȘI CONCENTRAȚIA

ASD fracția 3, soluție  
(ASD-3F-Antiseptic stimulator Dorogov fracția 3)

### 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

ASD fracția 3 conține un complex cu un conținut de cel puțin 90% de substanțe biologic active

#### Substanțe active:

Acizi carboxilici, hidrocarburi alifaticе și ciclice, alchilbenzeni, fenoli substituiți, derivați alchili ai pirolului, amine și amide alifaticе, precum și compuși cu o grupare sulfhidril activă.

Excipienți: apă.

### 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție pentru uz extern.

Soluție densă de culoare maro întunecată până la negru, cu miros caracteristic, solubilă în alcool, uleiuri vegetale și animale și practic insolubilă în apă.

### 4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

#### 4.1. Specii țintă:

Bovine, ovine, cabaline, porcine, câini și păsări de curte.

#### 4.2. Indicații pentru utilizare cu specificarea speciilor țintă:

ASD fracția 3 se indică animalelor în tratamentul plăgilor infectate atone (perioada de vindecare îndelungată), dermatitelor, proceselor infecțioase cronice a pielii și copitelor, ulcerelor trofice, în caz de fistule, pododermatită infecțioasă a ovinelor și necrobacterioză.

#### 4.3. Contraindicații:

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanțele active.

#### 4.4. Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Tineretului a se administra sub controlul medicului veterinar în urma evaluării raportului risc-beneficiu.

#### 4.5. Precauții speciale pentru utilizare

##### Precauții speciale pentru utilizarea la animale:

Particularități deosebite de acțiune a medicamentului la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit. Se recomandă respectarea dozajului indicat și a modului de administrare pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei sau mai multor doze, administrarea se reia în aceeași doză, conform aceeași scheme.

##### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

E important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Persoanelor hipersensibile la componentele medicamentului de uz veterinar li se recomandă evitarea contactului direct cu ASD-3F.

În caz de contact accidental a medicamentului de uz veterinar cu pielea sau cu tunicile mucoase oftalmice, ele se spală din abundență cu apă.



În caz de apariție a reacției alergice sau la ingerare, e important de adresat la o instituție medicală cât de repede posibil (cu sine de avut eticheta sau prospectul).

În timpul lucrului se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi. La finisarea lucrului mâinile se spală cu săpun.

#### **4.6. Reacții adverse (frecvență și gravitate):**

La administrarea conform prospectului dat, reacții adverse sau complicații nu apar. În caz de sensibilitate sporită sau apariția reacțiilor alergice, administrarea se stopează și se recurge la terapie simptomatică cu antihistaminice.

#### **4.7. Utilizarea în perioada de gestație, lactație:**

Femelelor gestante, în lactație, precum și descendenților acestora se va administra sub controlul medicului veterinar în urma evaluării raportului risc-beneficiu.

#### **4.8. Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:**

Nu se cunosc.

#### **4.9. Doză și calea de administrare:**

ASD-3F se indică animalelor extern nediluat sau în formă de soluție uleioasă de 25-50%.

Soluțiile uleioase se prepară în condiții aseptice, folosind uleiuri sterile de ricin, în floarea soarelui sau untură de pește, în care se adaugă ASD-3F steril, minuțios amestecând, în raport de 1:4 sau 1:1.

În tratamentul plăgilor infectate atone și a fistulelor, porțiunea afectată se spală cu soluție de 15-20% de ASD-2F până la încetarea eliminării exudatului purulent și apoi se aplică pansament (3 straturi) îmbibat cu soluție uleioasă de 25 % de ASD-3F care se fixează cu un bandaj. Pansamentul se schimbă zilnic, până la însănătoșire.

În cazul eczemelor, escarelor, dermatitelor, proceselor inflamatorii cronice a pielii, piodermiilor și ulcerelor trofice, pe suprafața afectată și 2-3 cm din țesutul limitrof se aplică soluție uleioasă de ASD-3F de 25-50%, 1 dată pe zi. Cura de tratament durează până la însănătoșire, dar nu mai mult de 21 zile.

În cazul afecțiunilor extinse ale pielii, soluție de 50% se aplică în mod alternativ pe diferite zone, acoperind într-un tratament nu mai mult de 10% din suprafața corpului animalului.

Pododermatita infecțioasă a ovinelor și necrobacterioza presupun curățarea suprafețelor afectate după care se aplică ASD-3F ca atare (nediluat) 1 dată pe zi. Se recurge la tratament complex în asociere cu terapia specifică și simptomatică până la dispariția simptomelor, dar nu mai mult de 28 zile.

#### **4.10. Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi):**

Nu sunt cazuri înregistrate.

#### **4.11. Perioada de așteptare:**

Carne, organe, lapte, ouă: 0 zile.

În caz de sacrificare, porțiunile carcasei tratate cu ASD-3F se curăță și se elimină.

## **5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE**

**Grupa farmacoterapeutică:** grupa medicamentelor tisulare;

**Codul veterinar ATC:** -



ASD-3F-Antiseptic stimulator Dorogov fracția 3 aparține grupului de medicamente care reglează procesele metabolice.

Datorită substanțelor active din ASD-3F, medicamentul posedă acțiune antiseptică și antiinflamatoare, stimulează activitatea sistemului reticuloendotelial, normalizează trofica și sporește regenerarea țesuturilor afectate.

După gradul de impact asupra organismului, face parte din substanțele cu pericol moderat (clasa 3 de pericol conform GOST 12.1.007).

## 6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

**6.1. Lista excipienților:** apă.

### 6.2. Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, aceste medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

### 6.3. Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere: 30 zile.

### 6.4. Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra în ambalajul original, separat de alimente și nutrețuri, protejat de lumină solară directă, la temperatura de la +4 °C până la +35 °C, în loc inaccesibil pentru copii.

### 6.5. Natura și compoziția ambalajului primar:

Ambalaj primar: flacon din sticlă a câte 50 și 100 ml cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.

### 6.6. Precauții speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

## 7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

OOO "NVȚ Agrovetșăcita", 129329, Rusia, or. Moscova, tr. Igarskii 4/2

## 8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

230150

## 9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

12.12.2023

## 10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2023

## INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Se eliberează fără o prescripție veterinară.



THE UNIVERSITY OF ALABAMA  
LIBRARY

ALABAMA

