

PROSPECT

Vaccin antirabic inactivat "BELRAB", tulpina "71 BelNIIEV-VGNKI"

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

SRL "BelVitunifarm" 211309, sat. Dolzha,
str. Sovetskaya, 26A, descriptul Vitebsk, regiunea Vitebsk, Republica Belarus.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Vaccin antirabic inactivat "BELRAB", tulpina "71 BelNIIEV-VGNKI"

3. DECLARAREA (SUBSTANȚED) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Substanța activă:

Vaccinul este produs din tulpina virusului rabic "71 BelNIIEV-VGNKI", inactivat cu teotropin sau alt inactivant cu ados în calitate de adjuvant hidroxid de aluminiu.

Virusul este cultivat în culturi celulare a rinichiului hamsterului sirian (BHK-21) sau a rinichiului maimuței verzi (Vero).

4. INDICAȚIE TERAPEUTICE

Vaccinul este destinată imunizării animalelor domestice și de fermă (bovine, ovine, caprine, cabaline, cămile, porcine, câini și pisici) împotriva rabiei în gospodăriile/ferme și zonele amenințate și nefavorabile pentru această boală.

5. CONTRAINDICAȚII

Animalelor cu semne clinice sau suspecte de boală a rabiei nu li se permite administrarea vaccinului.

6. REACȚII ADVERSE

Reacții de hipersensibilitate sunt uneori posibile după administrarea vaccinului. În acest caz este indicată administrarea subcutanată de adrenalină.

7. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, caprine, cabaline, cămile, porcine, câini și pisici.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru imunizarea profilactică a animalelor, care sunt supuse vaccinării pentru prima dată împotriva rabiei, vaccinul se administrează în două reprize cu un interval de 20-30 de zile. Animalelor imunizate anterior împotriva rabiei vaccinul se administrează o singură dată. Revaccinarea se efectuează peste 1 an.

Vaccinul se injectează subcutanat în regiunea gâtului sau intramuscular în coapsă. Înainte de administrare flaconul vaccinului se agita până se formează o suspensie omogenă.

Vaccinul se administrează în volum la o repriză, în doze precum urmează:

- cățeluși cu vârsta de două luni, și mai mari, și câini adulți de rase decorative mici (rasa bolonca, taxa, spitz, terrier etc.), precum și pisicile - 1ml;
- câinii de rasă mare (ciobănesc german, senbernar etc.) cu o greutate de peste 10 kg - 1,5 ml;
- ovine, caprine și porcine - 1,5 ml;
- bovine, cabaline, camile - 3,0 ml.



Vaccinarea de necesitate se efectuează nu mai târziu de 72 de ore după o posibilă infectare a animalului. Vaccinul se administrează acestor animale în patru reprize, conform dozelor sus indicate, timp de trei zile consecutive, începând cu a 16 zi de la începerea imunizării.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Vaccinarea se efectuează de către un medic sau felcer în conformitate cu regulile de aseptică și antisepctică. Locul injectării este tratat cu alcool cu o fracție de 70% sau cu un alt dezinfectant pentru uz extern utilizat în medicina veterinară. Seringele și acele înainte de aplicare sunt sterilizate prin fierbere, în caz contrar se utilizează seringi de unică folosință.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și lapte - 0 zile.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemîna copiilor.

A se păstra la frigider (+2°C - +8°C).

A se păstra într-un loc uscat și întunecat.

Perioada de valabilitate a vaccinului este de 1,5 ani de la data fabricării, cu condiția respectării cerințelor de transportare și depozitare.

Se va utiliza tot conținutul flaconului timp de 8 ore de la reconstituire.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Vaccinării sunt supuse animalele clinic sănătoase: de fermă - începînd cu vârsta de trei luni, cîinii și pisicile - începînd cu vârsta de două luni.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Animalele imunizate sunt monitorizate timp de o lună.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În procesul operării și administrării a vaccinului la animale urmează a fi respectate măsurile de igienă personală prezentate atunci, când manipulați medicamentele de uz veterinar imunologice.

În caz de contact accidental a vaccinului cu pielea sau cu conjunctiva, se clătește abundant cu apă caldă. După lucru mâinile și pielea expusă se spală cu apă și săpun.

După vaccinarea animalelor se întocmește un act în care se indică data vaccinării, starea epizootică a gospodăriei (zonei), numărul animalelor vaccinate, numărul loturilor și controlul vaccinului, numele producătorului, prenumele și inițialele persoanelor care au luat parte la procesul de vaccinare.

Pentru utilizator:

Toate operațiunile de utilizare vor fi efectuate doar conform recomandărilor specificate în prospectul vaccinului.

Utilizare în perioada de gestație, lactație:

Vaccinul este sigur și poate fi utilizat în perioada de gestație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

Supradozare:

Nu se cunosc cazuri.



13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Vaccinul sau flacoanele de sub vaccin nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.

Flacoanele cu vaccin deschise, dar neutilizate în decurs de 8 ore, sunt decontaminate prin fierbere timp de 15 minute.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL 12.2023

15. ALTE INFORMAȚII

Natura și compoziția ambalajului primar:

Flacoane de sticlă sterile cu un volum nominal de 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 200,0 ml.

Fiecare flacon de vaccin este închis cu un dop de cauciuc și rulat cu un capac din aluminiu.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest vaccin de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare:

SRL "ZooFarmAgro", MD-2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Camenița, 4a

tel.: (022) 855 073; tel.: (022) 355 240; gsm.: 069 827 427

e-mail: zoofarmagro@mail.ru; www.zoofarmagro.md; www.zooshop.md



