

PROSPECT

MEGAVIT soluție injectabilă

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina,

tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Megavit, soluție injectabilă

Soluție de culoare de la galben – deschis până la cafeniu.

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Un ml conține:

Substanța activă:

Vitamina A - 15000 UI,

Vitamina D3 - 7500 UI,

Vitamina E - 20,0 mg,

Vitamina B1 - 10,0 mg,

Vitamina B2 - 5,0 mg,

Vitamina B6 - 3,0 mg,

Vitamina B12 - 60,0 mcg,

Nicotinamidă - 50,0 mg,

D-pantenol - 25,0 mg,

Biotină - 125,0 mcg,

Acid folic - 150,0 mcg,

Metionină - 12,0 mg.

Excipienți:

Stabilizator (Span-80),

Apă pentru preparate injectabile.

4. INDICAȚII TERAPEUTICE

Prevenirea și tratamentul hipovitaminozei A, D și a vitaminelor grupului B, în caz de rahitism, osteodistrofie, cetoză, hepatodistrofie, boli ale aparatului respirator și gastrointestinal la animale tinere, prevenirea stresului de diverse etiologii, majorarea rezistenței, stimularea creșterii și dezvoltării animalelor tinere, stimularea funcției reproductive a reproducătorilor.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în cazuri de hipersensibilitate la substanțele active sau la excipienți ale medicamentului de uz veterinar.

6. REACȚII ADVERSE

Date cu referire la reacții adverse nu se cunosc.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Bovine (vacii, viței), cabaline (iepe, mânji), ovine, porcine (scroafe, porcei), câini, animale de blană.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Megavit se administrează intramuscular sau subcutanat o dată la 7 zile (vacii și cai - 6-8 injecții, alte animale - 4-6) în dozele terapeutice indicate (per animal, ml):

- vacii în repaus mamar - 25-30, vacii mulgătoare - 35-40, bovine tinere (la 100 kg) - 15,0; iepe, mânji - 20, în lactație - 25-30, mânji de 6-12 luni - 8-10, de 1-2 ani - 12-15; ovine gestante (ultima lună) - 4-5, în lactație (4-6 săptămâni) - 6-7; scroafe gestante - 10-12, scroafe care alăptează - 15; porcei cu greutatea de până la 10 kg - 1,5-2; de 10-20 kg - 2-3; de 20-50 kg - 4-5, mai mult de 50 kg - 7-8; câini adulți (la 10 kg greutate corporală) - 1,0; câini tineri (5 kg) - 0,8-1,0; animale de blană (la 5 kg) - 0,5.

Dozele profilactice sunt de două ori mai mici.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a asigura o dozare corectă, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne, organe, lapte - zero zile.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemîna copiilor.

A se păstra în loc întunecat, uscat, ferit de razele solare.

A se păstra la temperatura de la +15 până la +25°C.

Perioada de valabilitate - 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 14 zile, în cazul păstrării la temperatura de la +2 până la +8°C.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Medicamentul trebuie administrat nu mai mult de o dată pe săptămână.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale

În timpul efectuării lucrărilor cu medicamentul Megavit se recomandă respectarea regulilor de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Se interzice în timpul lucrului fumatul și consumul de alimente și băuturi.

La sfârșitul lucrului, fața și mâinile se spală cu apă și săpun.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu sunt restricții.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se amesteca cu alte medicamente de uz veterinar.

Supradozare:

Este posibilă hipervitaminoza.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele în vigoare.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

02.2024

15. ALTE INFORMAȚII

Ambalaj:

Flacoane din sticlă întunecată, închise cu dop din cauciuc și sigilate cu capac de aluminiu, a câte 10, 50 și 100ml.

Pentru orice informații referitoare la acest preparat de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare:

S.A Farmavet, Republica Moldova, mun. Chișinău 2059, str. Petricani, 198, tel.: 022-31-72-67; 022-31-72-70; 079536508; e-mail: farmavet2017@gmail.com

