

PROSPECT

DETOXOL 0,38 g pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

Vetsintez LLC

61001 Kharkiv, str. Smol'na 30, Ucraina

Tel: +380577143751

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

DETOXOL 0,38 g pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

Pentru câini și pisici

Ademetionină

3. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

1 flacon conține:

Substanța activă:

Ademetionină (sub formă de 1,4-butandisulfonat de ademetionină) – 0,38 g

Excipienți:

Flacon cu solvent (2,85ml) care conține L-lizină, hidroxid de sodiu, parahidroxibenzoat de metil, parahidroxibenzoat de propil, apă pentru injecții.

4. INDICAȚII TERAPEUTICE

Detoxol este indicat pentru tratamentul câinilor și pisicilor care suferă de hepatită cronică, coleastăză intrahepatică, degenerescența grasoasă a ficatului, encefalopatie hepatică, leziuni toxice de diverse etiologii, boli infecțioase și invazive însoțite de leziuni hepatice, în perioadele de încărcare intensivă cu medicamente; pentru detoxifierea ficatului, accelerarea regenerării hepatocitelor, îmbunătățirea fluxului biliar, prevenirea degenerării hepatice grase sau fibroase și normalizarea metabolismului.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

Nu se administrează animalelor cu tulburări legate de metabolizarea cianocobalaminei și/sau acidului folic.

Nu se utilizează la pisici în timpul gestației!

6. REACȚII ADVERSE

Nu au fost stabilite reacții adverse în urma utilizării în dozele recomandate.

Cu frecvența necunoscută: diaree, reacții la locul injectării, stare de rău, depresie, edem periferic, hipertermie și erupții cutanate, mâncărime.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Câini și pisici

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Calea de administrare: intravenos prin picurare; intramuscular imediat după preparare.

Câini

Se recomandă 15-25 mg de substanță activă la 1 kg greutate corporală animală.

1 flacon de produs este conceput pentru un animal cu greutatea de aproximativ 20 kg.

Medicamentul trebuie administrat o dată pe zi, de preferință dimineața, având în vedere efectul său tonic.

Pisici

20-30 mg de substanță activă la 1 kg de greutate corporală a animalului.

Dozajul produsului este prezentat în tabelul de mai jos.

Dozajul de DETOXOL pentru pisici:

| Greutatea corporală a animalului (kg) | Dozajul medicamentului (soluție proaspăt preparată), ml |
|---------------------------------------|---|
| Până la 2,0 | 0,30 până la 0,45 |
| 2,0 până la 5,0 | 0,45 până la 0,68 |
| Peste 5,0 | 0,75 până la 1,13 |

Pisicilor li se administrează de două ori pe zi intravenos, prin picurare, imediat după preparare.

Durata tratamentului depinde de complexitatea stării animalului. Perioada minimă recomandată de tratament este de 3 zile. În cazuri severe sau în caz de boală cronică, în funcție de concluzia medicului veterinar, durata tratamentului poate fi de 6 zile sau mai mult.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pulberea se dizolvă cu solventul atașat imediat înainte de utilizare.

Medicamentul (soluția proaspăt preparată) se administrează intravenos prin picurare; dacă nu este posibil, atunci intramuscular imediat după preparare.

Pentru administrare intravenoasă, o soluție de medicament proaspăt preparată trebuie diluată în 250 ml de soluție de clorură de sodiu 0,9% sau soluție de glucoză 5% și administrată lent, prin picurare, timp de 1-2 ore.

Medicamentul diluat nu trebuie păstrat.

Temperatura soluției preparate nu trebuie să depășească 25°C.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi între 10 °C și 25 °C.

Nerespectarea regimului de temperatură de depozitare poate reduce eficacitatea medicamentului sau poate duce la distrugerea completă a substanței active!

A nu se utiliza acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe ambalaj, după EXP: . Data expirării se referă la ultima zi din acea lună.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă

La câini: medicamentul trebuie administrat o dată pe zi, de preferință dimineața, având în vedere efectul său tonic.

La pisici: se administrează de două ori pe zi intravenos, prin picurare, imediat după preparare.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Pulberea se dizolvă cu solventul atașat imediat înainte de utilizare.

Medicamentul (soluția proaspăt preparată) se administrează intravenos prin picurare; dacă nu este posibil, atunci intramuscular imediat după preparare.

Medicamentul diluat nu trebuie păstrat.

Temperatura soluției preparate nu trebuie să depășească 25°C.

Medicamentul trebuie administrat o dată pe zi, de preferință dimineața, având în vedere efectul său tonic.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale

La manipularea medicamentului, respectați regulile de bază de igienă și siguranță adoptate la manipularea medicamentelor de uz veterinar.

La manipularea medicamentului de uz veterinar trebuie purtat echipament de protecție personal constând din respirator, mănuși.

În caz de contact cu ochii a solventului sau a soluției preparate pot apărea iritații, trebuie imediat să clătiți ochii cu apă curgătoare.

Spălați-vă mâinile după manipularea produsului.

În cazul administrării accidentale la om, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul de utilizare sau eticheta.

Utilizare în perioada de gestație, lactație:

Nu se utilizează la pisici în perioada de gestație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu amestecați cu soluții alcaline sau soluții care conțin ioni de calciu!

Nu se recomandă amestecarea medicamentului în aceeași seringă cu alte medicamente de uz veterinar.

Supradozare:

Nu se cunosc cazuri de efecte adverse în urma unei supradozări.

În cazuri rare, manifestări alergice, cum ar fi erupții cutanate, mâncărime și umflături; pot apărea diaree, stare de rău, depresie și hipertermie. În cazul apariției acestora, utilizarea medicamentului trebuie întreruptă și trebuie prescrisă terapia simptomatică.

Incompatibilități:

Nu combinați medicamentul cu alte medicamente de uz veterinar.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

03/2024

15. ALTE INFORMAȚII

Ambalaj:

Flacoane de sticlă neutră HC-1, HC-2, YCI-1, cu septuri de cauciuc montate și sigilate cu capace de sertizare din aluminiu.

Cîte 3 flacoane de sticlă de 0,38 g cu pulbere și 3 flacoane de sticlă de 2,85 ml cu solvent, în cutie de carton.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

