

PROSPECT
Biocan R suspensie injectabilă

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Bioveta a.s., Komenskeho 212, 68323 Ivanovice na Hane, Republica Cehă
Tel. 00420 517 318 500, Fax 00420517 318 653
Email: comm@bioveta.cz.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Biocan R suspensie injectabilă
Vaccin inactivat împotriva rabiei

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Compoziție -1 ml;

Substanța activă - *Virusul rabiei* inactivat, tulpina SAD Vnukovo-32 - min.2 UI

Excipienți - Mediu nutritiv MEM, algedrat, tiomersal

4. INDICAȚII TERAPEUTICE

Pentru imunizare activă a speciilor de animale țintă împotriva rabiei.

5. CONTRAINDICAȚII

Boli febrile sistemice. Animale nevaccinate, rănite sau în contact cu animalele infectate cu rabie. Animalele, care au mușcat sau rănit un om, pot fi vaccinate numai după încheierea perioadei de observație.

6. REACȚII ADVERSE

Reacție la nivel local (de obicei de dimensiunea unui bob de mazăre), se pot dezvolta la locul de administrare al vaccinului, care de obicei dispare spontan în termen de 3 săptămâni. Hipersensibilitatea se dezvoltă foarte rar.

Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a funcționat, vă rugăm să vă informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici, dihorni, bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Dozare – 1 ml din a 12-a săptămână de viață, indiferent de greutatea și rasa individului.

Mod de administrare:

- Subcutanat, cel mai bine în regiunea din spatele omoplatului.
- Intramuscular, cel mai bine în musculatura membrilor posterioare.

Animalele sunt vaccinate de la vârsta de 3 luni. Animale vaccinate mai devreme de vârsta de 3 luni trebuie să fie revaccinate după ce ajung la această vârstă (un interval de minim 14 zile între vaccinări trebuie să fie respectat). Animalele vaccinate pentru prima dată, la vârsta de 3-12 luni, trebuie să fie revaccinate la 1 an după prima vaccinare.

Revaccinarea efectuată la un an după primul vaccin protejează animalele împotriva rabiei cel puțin 2 ani. În scopul menținerii imunității, se recomandă să fie revaccinate în conformitate cu reglementările sanitare-veterinare din fiecare țară.

Schemă de vaccinare recomandată pentru Biocan

Vârsta cățelului	Situatie infecțioasă		
	Favorabilă	Nefavorabilă Parvoviroză	Nefavorabilă Distemper
5-6 săptămâni		Puppy (P) +C	Puppy (DP, DHPPi) +C
7-8 săptămâni		Puppy (P) +C	Puppy (DP, DHPPi) +C
8-10 săptămâni	DHPPi+L	DHPPi+L	DHPPi+L
12-16 săptămâni	DHPPi+LR (R)	DHPPi+LR (R)	DHPPi+LR (R)
Revaccinare anuală	DHPPi+LR (R)	DHPPi+LR (R)	DHPPi+LR (R)

Notă:

Vaccinurile dintre paranteze (P, R, DP, DHPPi) - indică posibilitatea de aplicare alternativă a unui vaccin din seria Biocan.

Vaccinurile marcate: +C, +L, +LR - indică posibilitatea de utilizare simultană sau combinație cu alte vaccinuri.

Alte vaccinări posibile:

Biocan M – vaccin împotriva *Microsporum canis* pentru câini cu vârsta de peste 12 săptămâni.

Biocan B - vaccin împotriva bolii Lyme pentru câini cu vârsta de peste 12 săptămâni.

Biocan T - vaccin împotriva tetanosului pentru câini cu vârsta de peste 12 săptămâni.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Agitați energic conținutul flaconului înainte de utilizare.

Vaccinați numai animale clinic sănătoase într-o stare nutrițională adecvată. Posibilele tratamente antiparazitare trebuie să fie efectuate înainte de vaccinare cu cel puțin 10 zile. O săptămână după vaccinare, nu este recomandat a se efectua antrenamente cu animalele vaccinate sau orice alte proceduri stresante.

10. PERIODA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la frigider (2°C- 8 °C).

A nu se congela.

A se proteja de lumină.

A se păstra în loc uscat.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 10 ore.

12 ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Vaccinați numai animale clinic sănătoase într-o stare nutrițională adecvată. Posibilele tratamente antiparazitare trebuie să fie efectuate înainte de vaccinare cu cel puțin 10 zile. O săptămână după vaccinare, nu este recomandat a se efectua antrenamente cu animalele vaccinate sau orice alte proceduri stresante.

Agitați energic conținutul flaconului înainte de utilizare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În caz de autoinjectare accidentală solicitați sfatul medicului și prezentați medicului prospectul vaccinului sau eticheta.

Utilizarea în timpul gestației și lactației:

În general, nu este oportună vaccinarea cățelelor gestante în ultimele două săptămâni înainte de fătare (manipularea animalelor gestante, neliniște, debut de anticorpi etc.).

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Vaccinul Biocan R poate fi utilizat separat, simultan sau în asociere cu alte vaccinuri Biocan:

A/ Vaccinul Biocan R poate fi utilizat ca diluant pentru alte vaccinuri Biocan liofilizate (de exemplu DHPPi, DP, P).

B/ Vaccinul Biocan R poate fi administrat simultan, de asemenea, cu vaccinuri lichide: Biocan C, Biocan B, Biocan M și Biocan L.

Nu există informații disponibile privind siguranța și eficacitatea acestui vaccin atunci când este utilizat cu oricare alt medicament de uz veterinar, cu excepția medicamentelor de uz veterinar menționate mai sus.

Supradozare:

O doză dublă de vaccin nu are alte efecte adverse asupra animalelor ținută față de cele observate la administrarea unei doze.

Incompatibilități:

A nu se amesteca cu nici un alt medicament de uz veterinar, cu excepția vaccinurilor liofilizate Biocan și vaccinurilor lichide Biocan C, Biocan B, Biocan M și Biocan L.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Toate produsele medicinale veterinare sau deșeurile de la acest produs trebuie să fie eliminate conform reglementărilor locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

03/2024

15. ALTE INFORMAȚII

Numai pentru uz veterinar.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Ambalaj:

A) cutie de plastic cu capac cu 10 godeuri:
10 x 1 ml de vaccin Biocan R

B) cutie de plastic cu capac cu 20 godeuri:
20 x 1 ml de vaccin Biocan R

C) cutie de plastic cu capac cu 100 godeuri:
50 x 1 ml de vaccin Biocan R
100 x 1 ml de vaccin Biocan R



D) cutie de plastic cu capac cu 10 godeuri:

1 x 5 ml

5 x 5 ml 5 x 10 ml

10 x 5 ml 10 x 10 ml

E) cutie de carton:

1 x 10 ml 1 x 20 ml 1 x 50 ml 1 x 100 ml

5 x 20 ml

10 x 20 ml

Prospectul este în fiecare ambalaj.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.