

PROSPECTUL**1. Denumirea medicamentului de uz veterinar**

Febtal-combo, suspensie orală

2. Compoziție1 ml de Febtal^R-combo conține:**Substanțe active :**

Praziquantel – 5 mg

Albendazol – 50 mg

Excipient(excipienți):

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți
Nipagin
Nipazol
Lactoză
Tvin-80
Apă purificată

Suspensie omogenă de culoare de la alb la gri deschis. În timpul păstrării se fracționează, dar la agitare sedimentul dispare.

3. Specii țintă

Câini, pisici.

4. Indicații de utilizare

Febtal-combo se indică câinilor și pisicilor cu scop profilactic și de tratament în cazul nematodozelor (toxocaroză, toxascaridoză, uncinarioză, tricocefaloză, anchilostomoză), cestodozelor (teniidoze, dipilidioză, echinococoză, difilobotrioză, mezocestoidoză) și în invazii mixte.

5. Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți, în dereglări funcționale severe hepatice sau renale, animalelor slăbite și bolnave de boli infecțioase.

Nu se utilizează la cățeluși și pisoi de vârstă sub 3 săptămâni.

6. Atenționări specialeAtenționări speciale:

Nu este destinat utilizării pentru dehelmintizarea animalelor productive.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Particularități deosebite de acțiune a medicamentului la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Febtal-combo, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamentele de uz veterinar.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active a medicamentului trebuie să evitarea contactul direct cu Febtal-combo.

În timpul lucrului se interzice fumatul și consumul de alimente sau băuturi.

La finisarea lucrului mâinile se spală cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

În caz de îngerare sau apariție a reacțiilor alergice, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul de utilizare a medicamentului de uz veterinar sau eticheta.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

Gestație și lactație:

Nu se utilizează în perioada de gestație și lactație.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se recomandă utilizarea concomitentă cu alte medicamente antihelmintice.

Supradozare:

În caz de supradozare se poate observa stare de apatie, refuz de hrană, salivare abundentă, dereglări a tractului gastrointestinal.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore:

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte antihelmintice.

7. Evenimente adverse

La administrarea conform prospectului dat, reacții adverse sau complicații nu apar. În caz de sensibilitate individuală sporită la Febtal-combo și apariție a reacțiilor alergice administrarea medicamentului se stopează și se indică medicamente antihistaminice și terapie simptomatică.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel.: 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Febtal-combo se administrează o dată, individual, dimineața cu o cantitate mică de hrană sau se introduce cu forța la baza limbii, în raport de 1 ml suspensie /1 kg greutate corporală.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Nu este necesară dietă de foamea prealabilă sau administrarea de laxative.

Înainte de administrare flaconul cu Febtal-combo se agită pentru a fi omogenizat.

Pentru dehelmintizarea animalelor cu o greutate corporală sub 0,5 kg la cantitatea de doză măsurată de suspensie se adaugă 0,3 ml de apă fiartă rece, apoi se agită bine flaconul și se administrează animalului.

Cu scop curativ medicamentul se va utiliza la indicațiile medicului veterinar, cu scop profilactic - trimestrial în doză terapeutică (e suficientă o singură administrare) și, de asemenea, cu 10-14 zile înainte de fiecare vaccinare.

10. Perioade de așteptare

Nu este cazul.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original.

A se feri de lumina directă a soarelui.

A se păstra separat de produse alimentare și furaje.

A se păstra la temperatură de la 0°C până la +25°C.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

240018

Ambalaj primar:

Pipetă din polimer a câte 1; 2 și 5 ml;

Flacon din sticlă sau polimer a câte 5; 7; 10 și 20 ml.

Ambalaj secundar:

Cutie din carton individuală care conține:

1 pipetă ; 2 pipete; 3 pipete.

Cutie din carton individuală care conține:

1 flacon din sticlă sau polimer x 5 ml

1 flacon din sticlă sau polimer x 7 ml

1 flacon din sticlă sau polimer x 10 ml

1 flacon din sticlă sau polimer x 20 ml

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

03/2024

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei > <și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

OOO NVТ Agrovetzașcita S-P, 129329, Federația Rusă, or. Moscova, tr. Igarskii 4/2

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

OOO NVТ Agrovetzașcita S-P,

141300, Federația Rusă, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Tsentralnaia 1

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL "ZooFarmAgro",

str. Camenița, 4a, mun. Chișinău,

MD-2001,

Republica Moldova

tel.: (022) 855 073; tel.: (022) 355-240;

gsm.: 069827 427

e-mail: zoofarmagro@mail.ru;

www.zoofarmagro.md; www.zooshop.md

17. Alte informații

Codul ATCvet: QP52AA51

Praziquantelul și albendazolul din compoziția medicamentului Febtal-combo posedă un spectru larg de acțiune antihelmintică împotriva tuturor fazelor de dezvoltare a nematodelor și cestodelor care parazitează la câini și pisici, inclusiv *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Toxascaris mystax*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichocephalus vulpis*, *Ancylostoma caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*, *Diphyllobotrium latum*, *Mesocestoides lineatus*.

Febtal-combo face parte din grupul substanțelor cu pericol moderat (clasa 3 de pericol, conform GOST 12.1.007-76). În doze recomandate nu posedă acțiune imunotoxică, sensibilizantă, embriotoxică și teratogenă. Este bine tolerat de câini și pisici de toate rasele și vârstele.