

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Fergolin^R

2. Compoziție

Substanța activă:

Gonadorelin acetat - 0,1 mg/ml

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților a altor constituenți	Compoziția cantitativă
Hidrofosfat de potasiu	1,5 mg
Dihidrofosfat de potasiu	1,3 mg
Clorură de sodiu	7,0 mg
Alcool benzilic	10,0 mg
Apă pentru injecții	până la 1 ml

Soluție injectabilă.

Soluție transparentă, de culoare de la incoloră până la nuanță slab gălbuie.

3. Specii țintă

Bovine (vacii).

4. Indicații de utilizare

Se indică pentru stimularea și sincronizarea ciclului estral, inducerea ovulației, tratamentul hipofuncției ovariene și a chisturilor foliculare, normalizarea ciclului estral la vacii.

5. Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.
 Nu se utilizează în cazurile de gestație avansată.

6. Atenționări speciale

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Particularități deosebite de acțiune a medicamentului la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit.

În caz de omitere a unei doze de administrare, schema de utilizare se recomandă a fi corectată în funcție de statutul fiziologic al animalului.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Fergolin^R e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Persoanelor cu hipersensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu medicamentul dat.

În timpul lucrului este interzis fumatul, consumul de alimente și băuturi.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

Precauții speciale pentru protecția mediului

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Utilizare în timpul gestației, lactației sau a ouatului

Se admite folosirea femelelor gestante în primele două săptămâni de gestație și în perioada de inseminare.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

Folosirea medicamentului de uz veterinar FergolinR nu exclude folosirea altor medicamente de uz veterinar, însă nu se recomandă a se amesteca FergolinR în aceeași seringă cu alte medicamente de uz veterinar.

Supradozare

Nu au fost depistate simptome specifice supradozării.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare

Nu sunt.

Incompatibilități majore

A nu se amesteca cu niciun alt medicament de uz veterinar.

7. Evenimente adverse

Reacții adverse sau complicații în urma administrării conform prospectului dat nu apar.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel.:022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Fergolin^R se administrează intramuscular, dozajul diferă în dependență de indicații:

Indicații	Dozaj
Tratamentul chisturilor foliculari și a hipofunției ovariene	5 ml, doză unică
Inducerea ovulației înainte de inseminare	2,5 ml, doză unică
Stimularea căldurilor și sincronizarea ciclului estral	1-2,5 ml, doză unică
Normalizarea ciclului estral (post-partum)	1-2,5 ml, doză unică

9. Recomandări privind administrarea corectă

Se recomandă respectarea termenilor și dozelor de administrare pentru a nu diminua eficiența medicamentului de uz veterinar.

Nu utilizați Fergolin^R dacă observați semne vizibile de deteriorare.

10. Perioade de așteptare

Zero zile.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemîna copiilor.

A se păstra în ambalajul original, separat de produse alimentare și hrană pentru animale.

A se feri de lumină directă a soarelui.

A se păstra la T°C de la +2 până la +25°C.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp.



Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Termen de valabilitate după prima deschidere: 28 zile.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu sistemele de colectare aplicabile medicamentului de uz veterinar respectiv.
Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

24047

Flacoane din sticlă a câte 20; 50 și 100 ml cu dop din cauciuc și capace securizate din aluminiu.
Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

06/2024

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

OOO "NITA-FARM",
410010, or. Saratov, str. Osipov V.I. 1
Tel/fax +7(4852)338-600
e-mail: client@nita-farm.ru

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL Zoofarmagro,
mun. Chișinău, str. Camenița 4a
Tel/fax 373 022 855-071; 373 69827427
www.zoofarmagro@mail.ru

17. Alte informații

Cod ATCvet: QH01CA01

