

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

PerFect TRIO 100mg/15mg/20mg

2. Compoziție

1 ml soluție conține:

Substanțe active:

100mg fipronil, 15mg ivermectin, 20mg piriproxifen.

Excipienți: dimetil sulfoxid, alcool benzilic, glicerol.

3. Specii țintă

Câini și pisici

4. Indicații de utilizare

Prevenirea și tratamentul câinilor și pisicilor invadate de ecto și endoparaziți:

- Puricii și larvele acestora (*Ctenocephalides* spp., *Pulex irritans*);
- Păduchii (*Linognathus setosus*);
- Paduchii hematofagi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*);
- Țânțari din trei tipuri: *Aedes*, *Culex* și *Anopheles*;
- Căpușe Ixodida (*Ixodes* spp., *Dermacentor* spp., *Haemaphysalis* spp., *Rhipicephalus* spp., *Boophilus calcaratus*), la stadiul de dezvoltare imaginal, nimfal și larvar;
- Acarieni acariformi (*Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*, *Sarcoptes canis* și *Cheyletiella* spp.);
- Acarieni trombidiformi (*Demodex canis*, *D. gatoi*, *D. felis*);
- Nematode ale tractului digestiv (*Toxocara* spp., *Toxascaris* spp., *Trichuris vulpis*, *Uncinaria stenocephala* și *Ancylostoma* spp.);
- Larve (microfilarii din stadiile L3 și L4) de *Dirofilaria immitis* și *Dirofilaria repens*.

5. Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

A nu se administra la pui de câine și pisici sub 3 săptămâni!

A nu se administra la puil de câine cu greutatea corporală de până la 2 kg!

Nu administrați animalelor slăbite și bolnave!

Nu utilizați produsul pentru tratamentul altor specii de animale, în special iepurilor, din cauza riscului de reacții adverse care pot duce la moartea animalelor.

Nu utilizați produsul la animalele gestante și femelele în timpul alăptării.

Produsul nu este recomandat pentru utilizare la câinii din rasele Collie, Sheltie, Bobtail, Ciobanesc Scoțian și amestecurile acestora din cauza posibilului efect neurotoxic al componentelor!

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

La animalele sensibile, după tratament pot apărea complicații cum ar fi salivația, anxietatea, care dispar rapid. În caz de complicații alergice, cum ar fi erupții cutanate, mâncărime și umflături, se recomandă terapia de desensibilizare. Ca antidot, utilizați sulfat de atropină.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

În cazul reacțiilor alergice la un animal sensibil la componentele produsului, trebuie administrate antihistaminice și agenți simptomatici.

Nu permiteți animalelor să lingă produsul.

Nu se recomandă scaldarea animalelor timp de 3 zile înainte și după administrarea tratamentului.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

La manipularea produsului, respectați regulile de bază de igienă și siguranță adoptate la manipularea medicamentelor de uz veterinar.

Păstrați produsul departe de flăcări deschise și dispozitive de încălzire.

Este important să respectați regulile de fixare în siguranță a animalelor.

După tratarea animalelor, spălați-vă mâinile cu apă și săpun.

Nu mângâiați blana și nu lăsați animalul în preajma copiilor mici, timp de 48 de ore după administrarea tratamentului.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

Gestație și lactație:

Nu se recomandă utilizarea produsului la animalele gestante și femelele în timpul alăptării.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

Supradozare:

Nu se cunosc cazuri de efecte adverse în urma supradozajului.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore:

Nu se cunosc.

7. Evenimente adverse

Nu se cunosc.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel.: 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Se va administra ca câini și pisici adulți, căței și pisoi cu vârsta de 3 săptămâni și peste și cu greutate corporală mai mare de 2 kg – o dată.

Aplicați produsul pe pielea uscată, nedeteriorată a animalelor:

- la pisici: pe pielea din spate a capului,
- la câini: între omoplați și de-a lungul coloanei vertebrale

și, în caz de infestare cu acarianul urechii *Otodectes cynotis*, pe pielea auricularului.

Pentru aplicarea produsului, este necesar să tăiați vârful pipetei și să separați părul animalului, astfel încât pielea să fie vizibilă, apăsați vârful pipetei pe piele și apăsați fiolă de mai multe ori pentru a aplica întregul conținut pe piele.

Dozele de produs sunt următoarele:

Câini și pisici de până la 4 kg masă/corp: o fiolă de 0,6 ml;

Câini și pisici cu greutatea între 4 kg și 10 kg masă/corp: o fiolă de 0,8 ml;

Câini cu greutatea între 10 kg și 20 kg masă/corp: o fiolă de 1,6 ml;

Câini cu greutatea între 20 kg și 40 kg masă/corp: o combinație de fiole de 0,8 ml și 1,6 ml sau o fiolă de 2,5 ml;

Câini peste 40 kg masă/corp: două fiole de 1,6 ml sau o fiolă de 4,0 ml.

Când animalele sunt afectate de căpușe ixodid, aplicați produsul în doză de 1 picătură direct pe căpușă și pe locul de atașare a acesteia pe piele. Dacă căpușa nu cade spontan în 20 de minute, îndepărtați-o cu grijă folosind o pensetă.

În scop terapeutic în caz de râie sarcoptică, demodicoză la câini și notoedroză la pisici, se utilizează produsul de 2-4 ori cu un interval de 7-10 zile; pentru tratament profilactic, folosiți-l o dată pe lună. Se recomandă ca tratamentul să fie efectuat într-un complex cu utilizarea agenților etiotropi, patogenetici și simptomatici.

Când tratați câini de talie mare, aplicați produsul pe piele în 3-4 locuri.

Pentru tratamentul otodectozei (scabie a urechii), utilizați o dată PerFect TRIO Drops. În timpul tratamentului, se recomandă curățarea canalului urechii de exudat și cruste, iar în caz de complicații cu otita medie trebuie de prescris agenți antimicrobieni și antiinflamatori. Dacă este necesar, repetați cursul de tratament.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Durata efectului protector al produsului după un singur tratament al animalului se păstrează împotriva căpușelor la câini până la 30 de zile, la pisici până la 21 de zile, împotriva insectelor la câini până la 2 luni, la pisici până la 1,5 luni. Tratamentul repetat al animalelor cu medicamentul în timpul sezonului activității paraziților este recomandat conform indicațiilor, dar nu mai mult de o dată pe lună. Pentru a preveni reinfestarea puricilor, așternutul animalelor trebuie înlocuit sau tratat cu agent insecticid în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

10. Perioade de așteptare

Nu este cazul.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi între 5 °C și 25 °C, ferit de lumină.

A nu se utiliza acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe ambalaj, după EXP:. Data expirării se referă la ultima zi din acea lună.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

240048

Fiole pentru picurare polimerice de 0,6 ml, 0,8 ml, 1,6 ml, 2,5 ml și 4,0 ml ambalate câte 1 sau 3 sau 6 bucăți, în cutie de carton.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

06/2024

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

Vetsintez LLC,
61001 Kharkiv, str. Smol'na 30, Ucraina
Tel: +380577143751

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova
Univet Farm SRL
str. Fântânilor 2, Trușeni, mun Chișinău
Tel: + 37368366651
univetfarm@gmail.com

17. Alte informații

Codul ATCvet: QP53 Ectoparaziticide, inclusiv insecticide și repelente (QP52AX65 Fipronil, combinații).