



PROSPECT

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe pentru pisici.

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe pentru câini

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul certificatului de înregistrare

OOO «NVȚ Agrovetzașcita», Federația Rusă.

129329, Federația Rusă, or. Moscova, str. Igarsckii proezd nr.4/2

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

OOO "AVZ S-P", Rusia, 141305, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Tentralinaia 1/11

Tel/fax (495) 721-49-81

www.avzvet.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe pentru pisici

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe pentru câini

Picături pentru uz extern.

Soluție transparentă uleioasă, de culoare de la gălbui la galben.

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe pentru pisici:

Substanța activă:

Fipronil - 10 mg/ml

Diflubenzuron - 1 mg/ml

Dicarboximid (MGK-264) - 1 mg/ml

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe pentru câini:

Substanța activă:

Fipronil - 50 mg/ml,

Diflubenzuron - 1 mg/ml

Dicarboximid (MGK-264) - 5 mg/ml

Excipienți:

Alcool izopropilic, polivinilpirolidon, tvin-80, polietilenglicol 400.

4. INDICAȚII TERAPEUTICE

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe se indică câinilor și pisicilor în tratamentul și profilaxia entomozelor (purici, păduchi malofagi și hematofagi), sarcoptozei, notoedrozei, otodectozei, heiletielozei și infestării căpușelor ixodide.

5. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitatea individuală sporită la substanțele active a medicamentului.

Nu se aplică animalelor bolnave de boli infecțioase, slăbite și în coalescență, catelusilor și puișoaișilor cu vârsta mai mică de 8 săptămâni, câinilor cu greutatea corporală mai mică de 2 kg.

Este contraindicat de a utiliza acest medicament auricular în cazul perforării de timpan.



6. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform indicațiilor, reacții adverse, de regulă, nu apar.

În caz de sensibilitate individuală sporită a animalului la substanțele active a medicamentului și apariție a reacțiilor adverse (salivație abundentă, lăcrimare, vomă), tratamentul se stopează și medicamentul se spală cu apă și săpun.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

7. SPECII ȘINTĂ

Pisici, câini

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

BARS^R clasic contra purici și căpuși se aplică 1 dată, prin picurare îndepărtând blana, pe pielea uscată, intactă, în câteva puncte, pe grumaz și la baza craniului (în locuri unde animalul nu ajunge să se lingă).

Luând în considerație specia și greutatea corporală a animalului este ales ambalajul de volumul necesar sau combinația lor și se aplică în doze recomandate din tabel.

Greutatea animalului	Volumul medicamentului în pipetă, ml	Doza de medicament, ml per animal	Numărul de pipete, necesare pentru tratare, buc	
CÂINI			volum corespunzător	Volum 1,4 ml
de la 2 la 10 kg	1,4	1,4	1	
de la 10 la 20 kg	2,8	2,8	1	2
PISICI				
până la 1 kg	1,0	0,3 (10 picături)	1	
de la 1 la 3 kg	1,0	0,6 (20 picături)	1	
>3 kg	1,0	1,0	1	

Pentru tratamentul câinilor cu greutatea corporală mai mare de 20 kg, medicamentul se administrează în raport de 1,4 ml la 10 kg greutate corporală.

Pentru combaterea căpușilor ixodide pe suprafața corpului animal, se aplică 1 picătură de medicament direct pe căpușă și pe locul fixării lui de piele. Dacă timp de 20-30 minute căpușa singură nu se desprinde, atunci foarte atent se extrage cu o pensetă și se nimicește.

În tratamentul otodectozei, din pavilionul urechii și canalul auditiv în prealabil se îndepărtează exudatul, cerumenul și crustele, apoi în fiecare ureche se picură câte 4-6 picături de medicament. Pentru distribuirea uniformă a medicamentului, pavilionul urechii se masează bine la baza lui. Restul medicamentului din pipetă se aplică pe piele la grumaz. În caz de otodectoză cronică, asociată cu otită se vor indica remedii antibacteriene și antiinflamatorii și se repetă tratamente auriculare cu BARS^R clasic contra purici și căpușe peste 7-10 zile.

Medicamentul se picură neapărat în ambele urechi, în caz dacă afectată de otodectoză doar una.

După picurarea medicamentului în urechi este necesar de fixat capul câinelui, pe o durată de câteva minute, pentru evitarea scuturării din cap a animalului și stropirii medicamentului administrat.





9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Tratamentul repetat să efectuează conform indicațiilor, dar nu mai des de o aplicare pe lună.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalaj închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la temperatură de la 2°C până la 25°C

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani din data producerii.

A nu se utiliza acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Acest medicament nu este indicat pentru utilizare animalelor de la care se obțin alimente.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularități deosebite în acțiunea medicamentului la prima lui administrare sau la anularea lui, nu au fost înregistrate.

În cazul administrării repetate, se recomandă respectarea termenilor recomandați cu insectoacaricide pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei aplicări, prelucrarea se reea în aceeași doză conform aceeși scheme.

Pentru a obține un efect de protecție optim, tratamentele trebuie efectuate cu cel puțin 24 de ore înainte de plimbarea presupusă a câinilor în locuri în care există posibilitatea habitatului paraziților.

Pentru excluderea reinfestării cu purici, așternutul animalelor se schimbă sau se prelucrează, inclusiv și podeaua din încăperi cu insecticide, în conformitate cu instrucțiunea lor de utilizare.

Nu se recomandă scăldatul animalului timp de 3 zile până la și după tratament.

Se recomandă de evitat pătrunderea medicamentului de uz veterinar pe mucoasele oculare a animalului.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu BARS^R clasic picături contra purici și căpușe este important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamentele de uz veterinar.

În timpul manipularilor cu preparatul dat se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi.

La finisarea lucrului, mâinile se spală cu apă caldă și săpun.

Nu se recomandă mângâierea animalului și contactul lui cu copii mici până la uscarea definitivă a suprafeței tratate (timp de 24 ore după tratare).

Persoanelor cu hipesensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu BARS^R clasic picături contra purici și căpușe.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul).

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Este interzisă utilizarea medicamentului în timpul gestației și alăptării.



Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu există date disponibile.

Supradozare:

În caz de supradozare sau îngerare, animalul poate manifesta salivă abundentă, tremor muscular, vomă. În astfel de cazuri medicamentul se spală de pe suprafața corăului cu apă și săpun, iar animalului se indică terapie simptomatică.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

09.2023

15. ALTE INFORMAȚII

Ambalajul primar:

Pipete-picurători din polimer x 0,3; 0,6; 1,0; 1,4; 2,8 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Eficacitate și siguranță clinică:

O singură administrare pe animal asigură moartea puricilor în 24 de ore, căpușelor Ixodida, păduchilor, păduchilor malofagi - în 48 de ore. Efectul protector al medicamentului durează împotriva căpușelor Ixodida până la 4 săptămâni, împotriva puricilor, păduchilor, păduchilor malofagi și acarienilor cheyletiella – până la 8 săptămâni.

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe după gradul de impact asupra organismului face parte din substanțele relativ toxice (clasa 3 de pericol conform GOST 12.1.007-76), în doze recomandate este bine tolerat de animale, nu posedă acțiune resorbtiv-toxică, local iritantă și sensibilizantă. Provoacă iritații în contact cu ochii.

Medicamentul este toxic pentru iepuri, pești și alți hidrobionți.

Se eliberează fără prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

SRL "Zoofarmagro", m. Chișinău, str. Camenița 4a, tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

