

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR ȘI CONCENTRAȚIA

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe pentru pisici

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe pentru câini

(BARS^R drops against fleas and ticks).

Denumirea internațională nepatentată: fipronil, diflubenzuron, dicarboximid.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe pentru pisici:

Substanța activă:

Fipronil - 10 mg/ml

Diflubenzuron - 1 mg/ml

Dicarboximid (MGK-264) - 1 mg/ml

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe pentru câini:

Substanța activă:

Fipronil - 50 mg/ml,

Diflubenzuron - 1 mg/ml

Dicarboximid (MGK-264) - 5 mg/ml

Excipienți:

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Picături pentru uz extern.

Soluție transparentă uleioasă, de culoare de la gălbui la galben.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă:

Pisici

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă:

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe se indică câinilor și pisicilor în tratamentul și profilaxia entomozelor (purici, păduchi malofagi și hematofagi), sarcoptozei, notoedrozei, otodectozei, heiletielozei și infestării căpușelor ixodide.

4.3 Contraindicații:

Sensibilitatea individuală sporită la substanțele active a medicamentului.

Nu se aplică animalelor bolnave de boli infecțioase, slăbite și în coalescență, catelusilor și puișoșilor cu vârsta mai mică de 8 săptămâni, câinilor cu greutatea corporală mai mică de 2 kg.

Este contraindicat de a utiliza acest medicament auricular în cazul perforării de timpan.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Acest medicament nu este indicat pentru utilizare animalelor de la care se obțin alimente.



4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularități deosebite în acțiunea medicamentului la prima lui administrare sau la anularea lui, nu au fost înregistrate.

În cazul administrării repetate, se recomandă respectarea termenilor recomandați cu insectoacaricide pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei aplicări, prelucrarea se reea în aceeași doză conform aceeși scheme.

Pentru a obține un efect de protecție optim, tratamentele trebuie efectuate cu cel puțin 24 de ore înainte de plimbarea presupusă a câinilor în locuri în care există posibilitatea habitatului paraziților.

Pentru excluderea reinfestării cu purici, așternutul animalelor se schimbă sau se prelucrează, inclusiv și podeaua din încăperi cu insecticide, în conformitate cu instrucțiunea lor de utilizare.

Nu se recomandă scăldatul animalului timp de 3 zile până la și după tratament.

Se recomandă de evitat pătrunderea medicamentului de uz veterinar pe mucoasele oculare a animalului.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu BARS^R clasic picături contra purici și căpușe este important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamentele de uz veterinar.

În timpul manipularilor cu preparatul dat se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi.

La finisarea lucrului, mâinile se spală cu apă caldă și săpun.

Nu se recomandă mângâierea animalului și contactul lui cu copii mici până la uscarea definitivă a suprafeței tratate (timp de 24 ore după tratare).

Persoanelor cu hipesensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu BARS^R clasic picături contra purici și căpușe.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

În caz de îngerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul).

4.6 Reacții adverse:

La administrarea conform indicațiilor, reacții adverse, de regulă, nu apar.

În caz de sensibilitate individuală sporită a animalului la substanțele active a medicamentului și apariție a reacțiilor adverse (salivație abundentă, lăcrimare, vomă), tratamentul se stopează și medicamentul se spală cu apă și săpun.

4.7 Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Este interzisă utilizarea medicamentului în timpul gestației și alăptării.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu există date disponibile.

4.9 Doza și calea de administrare

BARS^R clasic contra purici și căpuși se aplică 1 dată, prin picurare îndepărtând blana, pe pielea uscată, intactă, în câteva puncte, pe grumaz și la baza craniului (în locuri unde animalul nu ajunge să se lingă).





Luând în considerație specia și greutatea corporală a animalului este ales ambalajul de volumul necesar sau combinația lor și se aplică în doze recomandate din tabel.

Greutatea animalului	Volumul medicamentului în pipetă, ml	Doza de medicament, ml per animal	Numărul de pipete, necesare pentru tratare, buc	
CÂINI			volum corespunzător	Volum 1,4 ml
de la 2 la 10 kg	1,4	1,4	1	
de la 10 la 20 kg	2,8	2,8	1	2
PISICI				
până la 1 kg	1,0	0,3 (10 picături)	1	
de la 1 la 3 kg	1,0	0,6 (20 picături)	1	
>3 kg	1,0	1,0	1	

Pentru tratamentul câinilor cu greutatea corporală mai mare de 20 kg, medicamentul se administrează în raport de 1,4 ml la 10 kg greutate corporală.

Tratamentul repetat să efectuează conform indicațiilor, dar nu mai des de o aplicare pe lună.

Pentru combaterea căpușilor ixodide pe suprafața corpului animal, se aplică 1 picătură de medicament direct pe căpușă și pe locul fixării lui de piele. Dacă timp de 20-30 minute căpușa singură nu se desprinde, atunci foarte atent se extrage cu o pensetă și se nimicește.

În tratamentul otodectozei, din pavilionul urechii și canalul auditiv în prealabil se îndepărtează exudatul, cerumenul și crustele, apoi în fiecare ureche se picură câte 4-6 picături de medicament. Pentru distribuirea uniformă a medicamentului, pavilionul urechii se masează bine la baza lui. Restul medicamentului din pipetă se aplică pe piele la grumaz. În caz de otodectoză cronică, asociată cu otită se vor indica remedii antibacteriene și antiinflamatorii și se repetă tratamente auriculare cu BARS^R clasic contra purici și căpușe peste 7-10 zile.

Medicamentul se picură neapărat în ambele urechi, în caz dacă afectată de otodectoză doar una.

După picurarea medicamentului în urechi este necesar de fixat capul câinelui, pe o durată de câteva minute, pentru evitarea scuturării din cap a animalului și stropirii medicamentului administrat.

4.10 Supradozare:

În caz de supradozare sau îngerare, animalul poate manifesta salivă abundentă, tremor muscular, vomă. În astfel de cazuri medicamentul se spală de pe suprafața corăului cu apă și săpun, iar animalului se indică terapie simptomatică.

4.11 Perioada de așteptare:

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

Grupa farmacoterapeutică: fipronil, combinații

Codul veterinar ATC: QP53AX65





Particularități farmacodinamice:

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe posedă acțiune bine pronunțată față de stadiile larvare și adulte a pirucilor, păduchilor, păduchilor malofagi, acarienilor cheyletiella, căpușelor Ixodida și sarcoptice care parazitează pe pisici.

Mecanismul de acțiune a fipronilului constă în blocarea receptorilor GABA-dependenți (acidul gama-aminobutiric) a ectoparaziților, dereglarea transmiterii impulsurilor nervoși, ceea ce duce la paralizia și moartea a ectoparaziților.

Diflubenzuronul, inhibă sinteza de chitină la paraziți, dereglează procesul de năpîrlire, de depunere a ouălor și apariția larvelor, ceea ce duce la diminuarea populației.

Dicarboximidul este un sinergic și se asociază cu insecticidele pentru sporirea acțiunii lor. Dicarboximidul stopează detoxifierea microsomală a insecticidului, sporind toxicitatea lui pentru parazit.

Eficacitate și siguranță clinică:

O singură administrare pe animal asigură moartea puricilor în 24 de ore, căpușelor Ixodida, păduchilor, păduchilor malofagi - în 48 de ore. Efectul protector al medicamentului durează împotriva căpușelor Ixodida până la 4 săptămâni, împotriva puricilor, păduchilor, păduchilor malofagi și acarienilor cheyletiella – până la 8 săptămâni.

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe după gradul de impact asupra organismului face parte din substanțele relativ toxice (clasa 3 de pericol conform GOST 12.1.007-76), în doze recomandate este bine tolerat de animale, nu posedă acțiune resorbtiv-toxică, local iritantă și sensibilizantă. Provoacă iritații în contact cu ochii.

Medicamentul este toxic pentru iepuri, pești și alți hidrobionți.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

În urma administrării topice, substanțele active a medicamentului uniform se distribuie pe suprafața corpului neabsorbîndu-se în sînge, se acumulează în epiderm, foliculii piloși și glandele sebacee de pe suprafața corpului animal oferind o acțiune insectoacaricidă de contact și o protecție de lungă durată a animalului contra ectoparaziților.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Alcool izopropilic,
Polivinilpirolidon,
Tvin-80,
Polietilenglicol 400.

6.2 Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

6.3 Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani din data producerii.



APROBAT

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra în ambalaj închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la temperatură de la 2°C până la 25°C

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Pipete-picurători din polimer x 0,3; 0,6; 1,0; 1,4; 2,8 ml.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

OOO «NVT Agrovetsașcita», Federația Rusă.

129329, Federația Rusă, or. Moscova, str. Igarskii proezd nr.4/2

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe pentru pisici - 190041

BARS^R clasic picături contra purici și căpușe pentru câini - 190042

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

23.10.2019

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

09.2023

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Se eliberează fără o prescripție veterinară.



