

5. REACȚII ADVERSE

La pisici, după injectarea subcutanată în regiunea interscapulară, pot fi observate reacții la locul injectării (tumefacție, edem, eritem și indurație).

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, cabaline, câini și pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Cale de administrare

Bovine, cabaline: intravenous

Câini și pisici: intravenous, intramuscular, subcutaneous

Doză

Specie/ subcategorie	Butafosfan (mg/kg)	Vitamina B12 (μ g/kg)	Cantitate de produs (ml/kg)	Cale de administrare
Bovine	2,0-5,0	1,0-2,5	0,02-0,05	IV
Vitei	3,3-5,6	1,65-2,8	0,033-0,056	IV
Cabaline	2,0-5,0	1,0-2,5	0,02-0,05	IV
Mânji	3,3-5,6	1,65-2,8	0,033-0,056	IV
Câini	2,5-25	1,0-2,5	0,025-0,25	IV, IM, SC
Pisici	10-50	5-25	0,1-0,5	IV, IM, SC

La nevoie, doza se poate repeta, o dată pe zi.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Dopul flaconului poate fi perforat de până la 25 de ori. Dacă sunt necesare mai mult de 25 perforații, se recomandă utilizarea unui ac aspirator.

Pentru tratamentul câinilor și pisicilor se recomandă utilizarea ambalajului de 100 ml.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Bovine și cabaline (carne și organe): zero zile

Lapte: zero ore

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de temperatură la păstrare.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.



11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Se recomandă determinarea cauzei (cauzelor) tulburărilor metabolice sau reproductivă, pentru a defini cele mai adecvate măsuri de prevenire și tratament și necesitatea unei terapii cu suplimentarea fosforului și vitaminei B12.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre substanțe trebuie să evite contactul cu produsul.

Produsul poate fi ușor iritant pentru piele sau ochi. Prin urmare, expunerea cutanată și oculară trebuie evitată. În cazul expunerii accidentale cutanate sau oculare, clătiți pielea și/sau ochii cu apă.

Gestație și lactație

Siguranța produsului nu a fost stabilită la vaci gestante și în lactație, iepi, cățele și pisici. Cu toate acestea, utilizarea produsului în timpul gestației și lactației la aceste specii nu ar trebui să reprezinte o problemă deosebită.

Incompatibilități majore

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar, așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 28 zile.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din sticlă de tip II, de culoarea chihlimbarului, de 100 ml, cu dop din cauciuc bromobutilic și capac din aluminiu cu lamelă detașabilă de tip flip-off.

Flacon din sticlă de tip I, de culoarea chihlimbarului, de 250 ml, cu dop din cauciuc bromobutilic și capac din aluminiu cu lamelă detașabilă de tip flip-off.

Dimensiunea ambalajului:

Cutie cu 1 flacon de 100 ml

Cutie cu 1 flacon de 250 ml

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

06/2020

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR