

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Inspector Quadro Tabs

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Substanța activă:

Inspector Quadro Tabs conține substanțe active lufenuron, moxidectin și praziquantel.

Inspector Quadro Tabs este produs în patru doze (modificări):

Inspector Quadro Tabs	Lufenuron	Moxidectin	Praziquantel
Pentru pisici și câini 0,5 -2 kg	20 mg	0,6 mg	10 mg
Pentru pisici și câini 2 - 8 kg	40 mg	1,2 mg	20 mg
Pentru pisici și câini 8-16 kg	160 mg	4,8 mg	80 mg
Pentru câini peste 16 kg	320 mg	9,6 mg	160 mg

Excipienți:

Lactoză – pentru comprimate cu greutatea de 120mg și 240mg - 60,50%, pentru comprimate cu greutatea de 750mg și 1500mg – 53,36%; Amidon pregelatinizat - 9,00%; Aditiv alimentar „Aromă de vită” – 1,00%; Stearat de calciu – 1,00%; Gelatină – 1,00%; Aerosil - 2,00%; Colorant „Ciocolată brună” - 0,0015%.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate de uz intern.

Comprimate de culoare bej deschis până la bej, formă ovală, cu o renură adâncă în centru, cu greutate de 120, 240, 750 și 1500 mg.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Câini și pisici.



4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Inspector Quadro Tabs este indicat pentru câini și pisici adulți, căței și pisoi pentru tratamentul și prevenirea entomozelor, demodecozei, otodectozei, sarcoptozei, notoedrozei, acarozei cauzate de căpușe ixodide, nematodelor tractului gastrointestinal (toxocaroză, toxascaridoză, uncinarioză, anchilostomoză, trihocefaloză), cestode (teniidoze, dipilidioză, echinococoză, difilobotrioza, mezocestoidoză), invaziile asociative cu nematode și cestode, precum și pentru prevenirea dirofilariozei.

4.3 Contraindicații:

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți, inclusiv antecedentele de disfuncție renală și hepatică severă.

Animalele slăbite, bolnave de boli infecțioase și/sau cu o greutate mai mică de 0,5 kg, cățelei și pisoi sub vârsta de 6 săptămâni nu sunt supuși tratamentului.

Utilizarea medicamentului la căței de collie, bobtail, sheltie și alte rase sensibile la lactone macrociclice, dacă este necesar, se efectuează sub supravegherea unui medic veterinar.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu se administrează animalelor productive.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularitățile acțiunii la prima administrare a medicamentului sau în caz de anulare acestuia, nu s-au stabilit.

Când administrați medicamentul, trebuie să respectați timpul recomandat din prospect.

În cazul omiterii următorului tratament, se reia utilizarea medicamentului în aceeași doză, conform aceleiași scheme.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când lucrați cu Inspector Quadro Tabs, trebuie să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

La sfârșitul lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

În cazul contactului accidental al medicamentului cu pielea sau membranele mucoase ale ochilor, acestea trebuie clătite cu multă apă.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului ar trebui să evite contactul direct cu Inspector Quadro Tabs.

În cazul reacțiilor alergice sau a ingerării accidentale a medicamentului, trebuie să contactați imediat o instituție medicală (ar trebui să aveți prospectul de utilizare a medicamentului și o etichetă cu dvs.).



4.6 Reacții adverse:

De regulă, efectele secundare și complicațiile la utilizarea medicamentului, în conformitate cu această instrucțiune, nu sunt observate. La unele animale, este posibilă perturbarea tractului gastrointestinal și creșterea salivăției, care dispar în mod spontan și nu necesită utilizarea medicamentelor.

În cazul sensibilității individuale crescute la componentele medicamentului și apariției reacțiilor alergice, utilizarea medicamentului este oprită și animalului i se prescriu antihistaminice și terapie simptomatică.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Inspector Quadro Tabs nu trebuie administrat în timpul perioadei de gestație și alăptare.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu utilizați medicamentul simultan cu alți agenți antiparazitari care conțin lactone macrociclice, medicamente care inhibă piperazina și colinesteraza.


4.9 Doză și calea de administrare

Inspector Quadro Tabs se administrează pe cale orală animalelor în mod individual, în hrănirea de dimineață, cu o cantitate mică de hrană sau administrat forțat pe rădăcina limbii după hrănire într-o doză terapeutică minimă de 10 mg de lufenuron, 5 mg de praziquantel și 0,3 mg de moxidectină la 1 kg de greutate animală în proporție de:

	Inspector Quadro Tabs, 1 comprimat conține lufenuron/moxidectină/praziquantel			
Greutatea animalului	pentru pisici și câini 0,5-2 kg	pentru pisici și câini 2-8 kg	pentru pisici și câini 8-16 kg	pentru câini peste 16 kg
	20mg/0,6 mg/10 mg	40 mg/1,2 mg/20 mg	160 mg/4,8 mg/80 mg	320 mg/9,6 mg/ 160 mg
0,5 - 1 kg	½ comprimat	-	-	-
>1 – 2 kg	1 comprimat	-	-	-
>2 – 4 kg	-	1 comprimat	-	-
>4 – 8 kg	-	2 comprimate	-	-
>8 – 16 kg	-	-	1 comprimat	-
>16 – 32 kg	-	-	-	1 comprimat
>32 – 48 kg	-	-	-	1 + ½ comprimat
>48 - 64 kg	-	-	-	2 comprimate

După o singură administrare a medicamentului, efectul său antiparazitar durează până la 5 săptămâni.

Pentru ctenocefalidoze (infestarea cu purici), otodectoza și ixodidoza câinilor și pisicilor,



Inspector Quadro Tabs se administrează o singură dată, pentru a preveni reinvasia - o dată la 4-6 săptămâni pe tot parcursul sezonului de activitate ectoparazitara. Efectul insecticid al medicamentului se manifestă după 24 de ore, atingând un nivel maxim după 48 de ore.

Efectul acaricid al medicamentului se manifestă după 24 de ore, ținând cont de acest lucru, tratamentele trebuie efectuate nu mai târziu de 24 de ore înainte de al plimba animalul în zonele cu posibilul habitat a căpușelor (parcuri, piețe, păduri).

Cu scopul de a distruge ectoparaziții în încăperi și a preveni reinfestarea animalelor, cabinele, cuștile, așternuturile și păturile sunt prelucrate cu un insecticid aprobat pentru utilizare, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Atunci când animalele sunt afectate de râie sarcoptică, notoedrioze sau demodecoză, tratamentul se efectuează de la două până la cinci ori cu un interval de 7 până la 14 zile, până când animalul își revine clinic, ceea ce este confirmat de două rezultate negative ale încercărilor acarologice.

Se recomandă ca tratamentul animalelor să fie efectuat în complex cu utilizarea medicamentelor patogenetice și simptomatice.

În caz de helmintoze la animale în scop terapeutic, medicamentul se utilizează conform indicațiilor o singură dată; cu grad puternic de invazie se recomandă repetarea tratamentului după 10 - 14 zile. În scop profilactic, medicamentul este utilizat în doză terapeutică o dată la 3 luni, precum și cu 10-14 zile înainte de fiecare vaccinare.

Pentru a preveni dirofilarioza în regiunile nefavorabile bolii, medicamentul este utilizat în perioada de primăvară-vară-toamnă: înainte de începerea zborului țânțarilor (purători ai agentului patogen *D. immitis*) o singură dată, apoi o dată pe lună și ultima dată în sezon peste o luna după sfârșitul zborului insectelor.

Inspector Quadro Tabs nu distruge dirofilariile mature, dar reduce numărul de microfilarii care circulă în sânge și poate fi folosit în siguranță și pe animalele infestate.

4.10 Supradozare

În cazul unei supradoze de medicament, la animal pot fi observate stare depresivă, refuz de hrană, salivare excesivă, tulburări ale tractului gastrointestinal. În aceste cazuri, animalului i se prescriu enterosorbente și terapie simptomatică.

4.11 Perioada de așteptare:

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: medicamente antiparazitare în combinații;

Codul ATC: *QP52AA51*.



5.1.2 Mecanism de acțiune

Lufenuron (un compus din grupul benzoilfenilureelor) aparține insecticidelor din clasa inhibitorilor sintezei chitinei, are proprietăți larvicide pronunțate și activitate ovocidă de contact, practic nu acționează asupra insectelor adulte.

Moxidectin - un compus semisintetic al grupului milbemicin (lactone macrociclice) este activ împotriva agenților cauzali ai arahnentozelor, larvelor imago de nematozi. Are un efect stimulator asupra eliberării acidului gamma-aminobutiric, crește permeabilitatea membranelor pentru ioni de clor, care suprimă activitatea electrică a celulelor nervoase ale helminților, provocând afectarea mușchilor, paralizia și moartea ectoparaziților și nematozilor.

Praziquantel este un compus din grupul pyrazinoisoquinolina, activ împotriva cestodelor mature și imature. Mecanismul acțiunii se bazează pe inducerea degradării tegumentului și inhibarea fumarat reductazei, depolarizarea persistentă a celulelor musculare ale helmințului, perturbarea metabolismului energetic, care provoacă paralizia și moartea cestodelor și favorizează excreția lor din tractul gastrointestinal.

5.1.3 Efecte farmacodinamice

Combinația de lufenuron, moxidectină și praziquantel, care fac parte din medicament, oferă spectrul larg de acțiune antiparazitară împotriva tuturor etapelor de dezvoltare a puricilor (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*), acarienilor de scabie (*Otodectes cynotis*, *Sarcoptes canis*, *Notoedres cati*), demodecoze (*Demodex canis*) căpușe ixodide (*Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp.), paraziți rotunzi și teniele din tractul gastrointestinal al câinilor și pisicilor, inclusiv *Toxocara canis*, *Toxocara cati* (*Toxocara mystax*), *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Ancylostoma caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Alveococcus multilocularis*, *Mesocostoides lineatus*, *Dipylidium caninum*, *Dipyllobothrium latum*, *Multiceps multiceps*, precum și fazele larvare de dezvoltare a *Dirofilaria immitis* și *Dirofilaria repens*.

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică:

Inspector Quadro Tabs prezintă o înaltă eficiență și siguranță de utilizare la câini și pisici. Medicamentul poate fi cu ușurință administrat în orice condiții. Aceste aspecte diminuează în sine costul măsurilor de tratament și profilaxie, precum și riscurile de apariție a reacțiilor adverse și intoxicațiilor. Medicamentul este recomandat pentru tratamentul și profilaxia infestațiilor cu căpușe, purici și păduchi la pisici și câini.

Inspector Quadro Tabs, în funcție de gradul de impact asupra corpului, este clasificat ca o substanță „cu risc scăzut” (clasa de pericol 4 în conformitate cu GOST 12.1.007-76); în dozele recomandate nu are efecte imunotoxice, embriotoxice și teratogene.

Medicamentul este toxic pentru albine, precum și pentru pești și alte organisme acvatice.



5.2 Proprietăți farmacocinetice:

-Lufenuronul este absorbit rapid în stomac (se atinge un nivel suficient de absorbție atunci când stomacul este plin de alimente), excretat lent, ceea ce asigură o concentrație mare a compusului în organismul animalului timp de o lună. Intrând în corpul insectelor cu sângele unui animal, apoi în ouăle lor, lufenuron blochează formarea chitinei (componenta principală a acoperirii insectelor), larvele mor ca urmare a întreruperii proceselor de formare a cuticulei și, astfel, este împiedicată apariția următoarei generații de purici.

-Moxidectin este excretat din organism în principal nemodificat în decurs de 6 săptămâni.

-Praziquantel este absorbit rapid în tractul gastrointestinal, atingând concentrația maximă în plasma sanguină după 1-3 ore, și este distribuit în organele și țesuturile animalului; se leagă de proteinele serice ale sângelui (70-80%), este metabolizat parțial în ficat, re-excretat în intestin, excretat din organism în principal prin urină (până la 80%) în 48 de ore.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Lactoză, amidon pregelatinizat, aditiv alimentar „Aromă de vită”, stearat de calciu, gelatină, aerosil, colorant „Ciocolată brună”.

6.2 Incompatibilități:

Nu utilizați medicamentul concomitent cu alți agenți antiparazitari care conțin lactone macrociclice, medicamente care inhibă piperazină și colinesteraza.

6.3 Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare 36 luni.

Partea neutilizată a comprimatului poate fi plasată într-un blister și păstrată până la următoarea utilizare, dar nu mai mult de 3 luni de la deschiderea ambalajului.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

Depozitați medicamentul în ambalajul închis al producătorului, protejat de lumina directă a soarelui, separat de alimente și furaje, la o temperatură de la 0°C până la 30°C.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Inspector Quadro Tabs se eliberează ambalat a câte 2 comprimate în blistere, care sunt ambalate în cutii de carton a câte 2 blistere împreună cu instrucțiuni de utilizare.



6.6 Măsuri speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente de uz veterinar trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SA Firma științifico-productivă "Ecoprom", Federația Rusă, Regiunea Moscova, raionul Liuberți, or. Tomilino, str. Garșin nr.11.

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Inspector Quadro Tabs 0,5 -2 kg - 220031

Inspector Quadro Tabs 2 - 8 kg - 220030

Inspector Quadro Tabs 8-16 kg - 220029

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE *(sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)*

25.05.2022

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

05.2022

